

Intracaverneuze injecties

51.088N

Jan Yperman Ziekenhuis

Briekestraat 12, 8900 Ieper

info@yperman.net • 057 35 35 35

www.yperman.net •     

INFOBROCHURE

Intracaverneuze injecties

Beste patiënt,

Deze brochure geeft je meer informatie over intracaverneuze injecties.

Heb je na het lezen ervan nog vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen.
Je behandelende arts en de verpleegkundigen staan voor je klaar.

Wat zijn intracaverneuze injecties?

Dit zijn inspuitingen in de zwellichamen van de penis. Bij een erectie neemt de bloedtoevoer naar de zwellichamen (twee zijreservoirs van de penis) toe, waardoor de penis hard wordt. Bij erectiestoornissen is die functie echter aangetast.

Een vaatverwijdende stof wordt met een zeer fijne naald ingespoten aan de basis van de penis. Deze stof doet de slagadertjes maximaal opengaan, zodat de penis maximaal doorbloed wordt. Dit leidt tot een goede erectie.

Is het wel iets voor mij?

Deze therapie wordt voorgesteld wanneer medicatie onvoldoende werkt of te veel bijwerkingen geeft. Dat het om een injectie gaat zorgt vaak voor wat terughoudendheid, en dat is uiteraard begrijpelijk. De ervaring leert echter dat de tevredenheid over deze behandeling zeer hoog ligt.

Waarom wordt de eerste injectie op consultatie gegeven?

Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is niet iedereen geholpen met dezelfde dosis. Als de erectie onvoldoende sterk is na een eerste inspuiting, moet de dosering aangepast worden. Er moet dan gezocht worden naar een dosis die voor jou de juiste is.

Ten tweede vereist de injectie enige techniek die we je op consultatie aanleren.

Wat zijn de bijwerkingen?


Over het algemeen zien we een hoge tevredenheid van deze behandeling. Uitzonderlijk treden er bijwerkingen op. Na wat oefening wordt het prikken vrijwel pijnloos. Indien de injectie niet in propere omstandigheden gebeurt, bestaat er een klein risico op infectie.

Bij langdurig gebruik kan littekenweefsel ontstaan, wat hard aanvoelt. Om dit te vermijden wordt aangeraden om de injectieplaats te roteren.

Een ernstige bijwerking is het krijgen van een erectie die meer dan 4 uur aanhoudt (priapisme). Dan dien je naar de dienst spoedgevallen te komen. Door het geleidelijk aan opdrijven van de dosis is dit echter uiterst zeldzaam geworden.

Hoe spuit ik het product in?

- Bepaal eerst de plaats van injectie. Houd hiervoor de penis met je niet-dominante hand horizontaal. Kies een plaats ongeveer halverwege of iets naar je toe. Blijf uit de buurt van de eikel.
- De zwellichamen bevinden zich aan de zijkant. Prik dus niet boven- of onderaan. De beste positie is schuin bovenaan. Prik steeds in een hoek van 90 graden, dus recht op de penis.
- Desinfecteer vervolgens de huid van de penis op de plaats waar je gaat prikken. Breng de naald volledig in tot aan de basis. Geen zorgen, deze is zeer fijn en kort. Spuit de voorgeschreven dosis traag in en verwijder daarna de naald.
- Druk gedurende 1 minuut ter hoogte van de injectieplaats om een eventuele bloeding te voorkomen. Na 5 à 10 minuten zul je een erectie krijgen.



Jan Yperman Ziekenhuis

Briekestraat 12, 8900 Ieper • info@yperman.net • 057 35 35 35



www.yperman.net