

Vaccinations pour les enfants de 0 à 18 ans



1. **L'ONE** fournit gratuitement certains vaccins. Vous trouverez la liste de ces vaccins sur www.one.be (ou www.kindengezin.be si vous habitez la Flandre) ou dans le Carnet de l'Enfant.
2. **Vaccins non remboursés**. Ces vaccins ne sont pas disponibles à l'ONE.

⇒ Méningocoques B:

Les méningocoques du groupe B peuvent causer une infection sévère des méninges (méningite). Cette maladie est rare, mais a souvent des conséquences très graves (décès, séquelles permanentes).

Le Conseil supérieur de la Santé recommande la vaccination chez:

- Les enfants de 0 à 5 ans
- Les adolescents de 15 à 19 ans
- Les personnes courant un risque accru (à discuter avec le médecin)

Schéma de vaccination:

- 2 à 5 mois: 4 doses.
- 6 à 23 mois: 3 doses.
- À partir de 2 ans: 2 doses.

Prix : le seul vaccin disponible est Bexsero (86,52 € par dose).

Effets indésirables possibles de la vaccination:

- Fièvre.
- Rougeur et douleurs musculaires à l'endroit de l'injection.
- Chez les adolescents: malaise et maux de tête.

⇒ Varicelle:

La varicelle est une maladie très fréquente. Dans un petit nombre de cas on note des complications graves (pneumonie, septicémie, lésions cérébrales).

15 à 20 % des enfants qui ont eu la maladie souffriront plus tard d'un zona.

Recommandation du Conseil supérieur de la Santé : La vaccination est bénéfique pour l'enfant, mais n'est pas recommandée de manière généralisée.

Schéma de vaccination:

- La vaccination est possible à partir de 1 an, et consiste en 2 doses.
- À l'âge de 12 mois, la première dose peut être administrée sous la forme d'un vaccin combiné : rougeole, rubéole, oreillons et varicelle. Ce vaccin est administré à la place du vaccin habituel contre la rougeole, la rubéole et les oreillons.

Prix:

- Vaccin contre la varicelle: Varilrix (48,34 € par dose) ou Provarivax (52,52 € par dose)
- Vaccin combiné: Priorix tetra (63,93 € par dose)

Effets secondaires possibles:

- Fièvre, avec un risque légèrement accru de convulsions fébriles après le vaccin combiné.
- Rougeur et douleurs musculaires à l'endroit de l'injection.

3. **Vaccinations de voyage**: informations disponibles via la clinique du voyage sur www.yperman.net (offre médicales, services, maladie du voyage, clinique du voyage)

4. **Plus d'infos** :

www.hogegezondheidsraad.be

Jan Yperman Ziekenhuis

Briekestraat 12 • 8900 Ieper • www.yperman.net

Pédiatrie • 057 35 75 00 • secpediatrie@yperman.net

