

Richtlijnen voor het correct inhaleren van medicatie: de turbohaler

Gebruik:

1. Verwijder de beschermdop.
 2. Sta recht en houd de Turbohaler® rechtop.
 3. Draai de gekleurde ring onderaan eerst naar rechts, dan naar links.
U hoort een klik- de dosis ligt klaar.
 4. Adem diep uit naast de Turbohaler®.
 5. Neem het mondstuk in de mond en sluit de lippen erom heen.
 6. Adem krachtig en diep in.
 7. Neem de inhalator uit de mond.
 8. Houd de adem 5 tal seconden in en adem daarna rustig uit.
 9. Spoel de mond met water (en uitspuwen) na het inhaleren.
- Opmerking : herhaal stap 3 tot 8 bij meerdere inhalaties.



Onderhoud:

Reinig het mondstuk met een droog doekje indien nodig.

Aandacht:

- U merkt geen smaak noch geur want:
 - de Turbohaler® geeft een kleine hoeveelheid poeder vrij.
 - de Turbohaler® bevat geen drijfgassen.
- Overdosereren kan niet, er komt telkens maar 1 dosis vrij.
- Er is een controle venster met de resterende hoeveelheid medicatie.
 - Bij Pulmicort® : bij het verschijnen van een rood lijntje resten er nog 20 dosissen, indien er een volledig rood venster verschijnt is de Turbohaler® leeg.
 - Bij Symbicort® duidt een dosisteller aan wanneer het toestel leeg is.
- Het geluid dat u hoort bij het schudden is niet het geneesmiddel maar de droogkorreltjes in een apart reservoir.

Bij vragen:

Raadpleging kindergeneeskunde Jan Yperman Ziekenhuis
Breng bij een geplande controle altijd uw medicatie mee

057/35.75.00

NUTTIGE LINKS: belgianrespiratorysociety.be/nl/inhalation-video of App : 'MyPuff'