



# BEHANDELING BIJ DE ZIEKTE VAN DUPUYTREN: XIAPEX


Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper •  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net) • 057 35 35 35  
[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net) •

## Wat is de ziekte van Dupuytren?

De ziekte van Dupuytren is genoemd naar Dr. Guillaume Dupuytren die deze aandoening voor het eerst chirurgisch behandelde in 1831.

De ziekte wordt **gekenmerkt** door een **progressieve aantasting van de weefsels van de handpalm en de vingers**. Het zijn de **pink** en de **ringvinger** die het **frequentst getroffen** worden.

De ziekte manifesteert zich vooral bij mannen. 80% van de patiënten met deze aandoening zijn tussen de 40 en 70 jaar oud. De exacte oorzaak is nog niet gekend, maar er is een belangrijke familiale voorbeschikkende factor. De 'streng' die ontstaat aan de binnenkant van de hand kan na verloop van tijd dikker worden en inkorten waardoor één of meerdere vingers naar binnen worden getrokken. Deze buiging van de vingers noemen we een contractuur.



De aanwezige strengen en contracturen **veroorzaken** vaak een uitgesproken **hinder bij het gebruik van de hand**. Vroeger werd hiervoor altijd een heelkundige ingreep voorgesteld.

De aanwezige strengen en contracturen **veroorzaken** vaak een uitgesproken **hinder bij het gebruik van de hand**. Vroeger werd hiervoor altijd een heelkundige ingreep voorgesteld.

Uw arts stelde nu een **behandeling voor met Xiapex**. Dit is een enzym, (collagenase clostridium histolyticum) dat in de streng wordt geïnjecteerd om deze te verweken. In een tweede fase gaan we deze streng 'breken' of scheuren door de aangetaste vinger te strekken.


## Hoe kan deze ziekte behandeld worden?

De behandeling omvat dus **2 fasen**:

**Fase 1: op de eerste dag wordt de streng geïnfiltrerd met Xiapex**

Dit gebeurt **zonder verdoving** daar dit de plaatsbepaling en de inspuiting voor de arts bemoeilijkt.

Na de inspuiting krijgt u **een klein verband**. Houd dit droog. U mag de hand gebruiken, doch beperkt. Doe geen handenarbeid of zwaar werk.



**Probeer niet zelf de vinger te strekken en houd de hand in hoogstand.** Na injectie moet u nog enkele minuten worden geobserveerd in verband met mogelijke bijwerkingen of allergische reacties.

## **Fase 2: 24 tot 48 uur later volgt de vingerstrekprocedure.**

*(In uitzonderlijke gevallen strekt de vinger zich vanzelf na de injectie)*

Deze fase gaat door **in het operatiekwartier onder lokale verdoving**. Het “breken” van de streng gaat gepaard met een duidelijk voelbare en hoorbare ‘krak’. Een **verbetering** is **ONMIDDELIJK merkbaar**.

Vervolgens wordt er in de **gipskamer** een **afneembare spalk** voor u gemaakt, die u gedurende de nacht zal moeten dragen. Dit kan tot 4 maanden duren, de arts zal u hierover inlichten. In principe is kinesitherapie nadien niet nodig.



U keert terug voor **controle na ongeveer 30 dagen**. Tijdens deze consultatie kan u, indien nodig, verdere behandelingen met de arts bespreken. U zult gevraagd worden **dagelijks vingeroefeningen uit te voeren**. Volg de instructies van uw arts over wanneer u uw normale activiteiten mag hervatten. De arts zal u ook adviseren in verband met te nemen pijnstillers.

Bij onvoldoende resultaat na een eerste behandeling, kunnen nog 2 behandelingen gegeven worden. Maximaal drie injecties per vinger (met een interval van ongeveer 30 dagen) mogen gegeven worden.

## **Risico's:**

Overloop met uw behandelende arts de medicatie die u neemt.

Als de te behandelen streng vastzit aan de huid is er een verhoogd risico dat de huid openscheurt tijdens de vingerstrekprocedure. In dit geval geven wij u richtlijnen mee om de wonde te verzorgen. Lokale zwelling en onderhuidse bloeding kunnen optreden. Dit is geen reden tot ongerustheid.

Aangezien Xiapex niet de oorzaak van de ziekte behandelt, is er een mogelijkheid dat de streng terugkeert.

## Mogelijke bijwerkingen:

- reacties op de injectieplaats, zoals bloeding, pijn, zwelling, gevoeligheid en blauwe plekken
- jeuk en of zwelling in de hand of arm
- pijnlijk gevoel in hand, pols of arm
- gezwollen klieren bij de elleboog of onder de arm, in de oksel
- ruptuur van de pees
- letsel aan de zenuw

## Wanneer moet u de hulp inroepen van een arts:

Een ernstige allergische reactie kan bijvoorbeeld één van de volgende tekenen veroorzaken:

- roodheid of uitslag over een groot gebied
- zwelling
- ademhalingsmoeilijkheden, dichtgeknepen keel, moeilijk slikken of borstbeklemming
- duizeligheid

Als u één van deze bijwerkingen waarneemt waarschuw dan uw huisarts of de behandelende geneesheer of ga naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

## CONTACTGEGEVENS:

- Dienst Orthopedie Jan Yperman Ziekenhuis: 057/35.73.70
- Rechtstreeks nummer gips-/verbandmeester : 057/35.74.86

### DATUM EN UUR INJECTIE OP DE CONSULTATIE ORTHOPEDIE:

.....

### DATUM EN UUR MANIPULATIE IN DAGZIEKENHUIS:

.....

### DATUM EN UUR CONTROLE OP DE CONSULTATIE ORTHOPEDIE:

.....