

CONSEILS POUR LES OPERATIONS DE KYSTES



Lors de l'opération d'un kyste ou d'une résection apicale, le foyer d'inflammation, qui se situe au-dessus ou autour de la racine de la dent, est enlevé. Ceci peut se faire par voie « orthograde » (la couronne dentaire est ouverte et on réalise une obturation canalaire) ou par voie « rétrograde » (une seconde obturation est placée sur l'obturation canalaire existante).

Merci de nous avoir accordé votre confiance. Voici quelques conseils et messages de réconfort qui vous guideront en toute confiance vers une guérison de qualité.

1. Un gonflement de la joue du côté opéré surviendra après l'intervention. Ce gonflement est maximal le second jour et diminuera progressivement dès le quatrième jour. En appliquant sans tarder de la glace (emballée dans un sac contenant également un petit essuie) contre la joue du côté opéré, le gonflement peut être contenu. Il est utile de répéter ce geste durant 24 heures. La première nuit, mieux vaut vous munir d'un coussin supplémentaire ou soulever l'extrémité du lit côté tête. Il est préférable de dormir sur le côté non opéré ou sur le dos. Veuillez prendre contact avec nous si un nouveau gonflement ou une recrudescence de la douleur survient après quatre à six jours.
2. Le gonflement peut aller de pair avec un inconfort et une douleur d'intensité moyenne. Après l'intervention, prenez un antidouleur dès que possible et n'attendez pas que la douleur se manifeste. En cas de très forte douleur, veuillez nous contacter.
3. Si un saignement résiduel apparaît, placez une compresse humide contre la plaie pendant quelques minutes et exercez une légère pression. Répétez plusieurs fois ce geste si nécessaire. Si les saignements résiduels persistent, veuillez nous contacter.
4. Il est conseillé de ne pas se rincer la bouche le jour de l'intervention et d'éviter les boissons chaudes. Une alimentation douce est parfois indiquée les premiers jours. Le jour suivant l'intervention, les dents doivent à nouveau être brossées à l'aide d'une brosse à dents souple et il faut rincer la bouche à l'aide d'une solution buccale.
5. Une coloration bleutée de la peau apparaît parfois localement ; elle disparaîtra en l'espace d'une ou de deux semaines.

Centre hospitalier Jan Yperman
Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

6. Durant la période postopératoire, une sensation d'engourdissement ou de sensibilité modifiée peut survenir au niveau de la lèvre inférieure et/ou de la langue ('paresthésie') ; elle est liée à la position du kyste par rapport aux faisceaux nerveux. Temporaire, elle disparaît habituellement en l'espace de quelques jours ou semaines.
7. Les douleurs aux coins de la bouche peuvent facilement être traitées en appliquant de la vaseline.
8. Les fils de suture sont résorbables ; s'ils persistent, il est conseillé de les faire enlever lors d'un contrôle de suivi chez votre dentiste.
9. Si un plombage temporaire a été placé au niveau de la couronne de la dent, veuillez prendre un rendez-vous chez votre dentiste pour réaliser un plombage définitif dans les semaines à venir.
10. Rappelons que le tabagisme et le manque d'hygiène buccale augmentent considérablement le risque d'infection et ralentissent la guérison. Nous conseillons un arrêt tabagique d'environ 5 jours.

Les informations ci-dessus ne sont qu'une aide pour la période qui suit immédiatement l'intervention. Si des questions persistent, veuillez nous contacter.

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement !

Dr. C. Verhelst
Dr. E. Matthys
Dr. O. Bouckenooghe