

CONSEILS POUR LES IMPLANTS DENTAIRES



Jan Yperman Ziekenhuis

Lors d'une opération d'implant, une vis en titane est placée dans l'os de la mâchoire ; elle doit servir de pilier au dentiste afin de placer une couronne, un bridge ou une prothèse amovible.

Merci de nous avoir accordé votre confiance. Voici quelques conseils et messages de réconfort qui vous guideront en toute confiance vers une guérison de qualité.

1. Un gonflement de la joue du côté opéré surviendra après l'intervention. Ce gonflement est maximal le second jour et diminuera progressivement dès le quatrième jour. En appliquant sans tarder de la glace (emballée dans un sac contenant également un petit essuie) contre la joue du côté opéré, le gonflement peut être contenu. Il est utile de répéter ce geste durant 24 heures. La première nuit, mieux vaut vous munir d'un coussin supplémentaire ou soulever l'extrémité du lit côté tête. Il est préférable de dormir sur le côté non opéré ou sur le dos. Veuillez prendre contact avec nous si un nouveau gonflement ou une recrudescence de la douleur survient après quatre à six jours.
2. Le gonflement peut aller de pair avec un inconfort et une douleur d'intensité moyenne. Après l'intervention, prenez un antidouleur dès que possible et n'attendez pas que la douleur se manifeste. En cas de très forte douleur, veuillez nous contacter.
3. Une légère fièvre est normale le jour qui suit l'intervention. Veuillez-vous reposer et boire abondamment.
4. Il est conseillé de ne pas se rincer la bouche le jour de l'intervention et d'éviter les boissons chaudes. Une alimentation liquide est parfois indiquée les premiers jours. Le jour suivant l'intervention, les dents doivent à nouveau être brossées à l'aide d'une brosse à dents souple et il faut rincer la bouche à l'aide d'une solution buccale.
5. Le processus de guérison requiert un arrêt tabagique. Le tabagisme et le manque d'hygiène buccale augmentent considérablement le risque de perte de l'implant et/ou de l'os reconstruit.
6. Durant les deux premières semaines, gardez la prothèse hors de la bouche autant que possible. Après cette période, la prothèse pourra être adaptée par votre dentiste.
7. Les douleurs aux coins de la bouche peuvent facilement être traitées en appliquant de la vaseline.

Centre hospitalier Jan Yperman
Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

8. Les fils de suture sont résorbables; s'ils persistent, il est conseillé de les faire enlever lors d'un contrôle de suivi chez votre dentiste.
9. Une coloration bleutée de la peau apparaît parfois localement. Celle-ci peut même atteindre le cou en cas d'intervention au niveau de la mâchoire inférieure. Elle disparaîtra après une à deux semaines.
10. Durant la période postopératoire, une sensation d'engourdissement ou de sensibilité modifiée peut survenir au niveau de la lèvre inférieure et/ou de la langue (« paresthésie »). Temporaire, elle disparaît habituellement en l'espace de quelques jours ou semaines.

Les informations ci-dessus ne sont qu'une aide pour la période qui suit immédiatement l'intervention. Si des questions persistent, veuillez nous contacter.

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement!

Dr. C. Verhelst
Dr. E. Matthys
Dr. O. Bouckenooghe