



# Proefblokkade/ thermolesie ganglion sphenopalatinum

79.009N



057 35 61 20 (8:30 uur – 17:00 uur)



[pijnkliniek@yperman.net](mailto:pijnkliniek@yperman.net)



[www.yperman.net](http://www.yperman.net)

## **Doel van de behandeling:**

### **Proefblokkade:**

Een proefblokkade is een vorm van een onderzoek waarbij, met behulp van een naald, een kortdurende verdoving wordt gegeven en om een indruk te krijgen of het zinvol is om dit definitief te behandelen. De behandeling van het ganglion sphenopalatinum wordt bij bepaalde aangezichtspijnen toegepast. Hiermee kan in een aantal gevallen de pijn verminderen of zelfs verdwijnen.

### **Thermolesie:**

De behandeling van het ganglion sphenopalatinum wordt bij bepaalde aangezichtspijnen toegepast. Thermolesie is een warmte behandeling waarbij in dit geval het ganglion sphenopalatinum (zenuwknoop in het gelaat) wordt aangeprikt en selectief wordt opgewarmd. De blokkade is meestal voorafgegaan door een proefblokkade van het ganglion sphenopalatinum. Hiermee kan in een aantal gevallen de pijn verminderen of zelfs verdwijnen.

## **Vorbereiding:**

- De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling.
- U dient 4 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor vast voedsel.
- En u dient 2 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor heldere vloeistoffen.
- Onder vast voedsel verstaan wij bijvoorbeeld: beschuit en/of crackers.
- Onder heldere vloeistoffen verstaan wij: water, thee en zwarte koffie.
- Enkel wanneer u diabetes hebt, mag u na overleg met uw arts een lichte maaltijd voor in de ingreep nuttigen.
- Het is niet toegestaan de dag van ingreep zelf met de wagen te rijden. Er zal een begeleider moeten voorzien worden op de dag van de ingreep. Gelieve dit dan ook kenbaar te maken bij de aanvang van de dagopname.

## **Medicatie:**

Uw thuismedicatie mag u zoals gewoonlijk innemen met uitzondering van bloed verdunnende medicijnen.

Uw behandelend arts van de Pijnkliniek zal u hierover informeren. Eventueel zal de arts voor u een aanvullend laboratorium onderzoek aanvragen. De uitslag is dan bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Acetylsalicylzuur (Asaflow®, Cardioaspirine®...) mag verder genomen worden, tenzij anders vermeldt door de pijnarts.

## **Behandeling:**

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan met uw identiteitskaart aan de automatische check-in balie, waarna u zal doorverwezen worden naar een onthaalmedewerker. De opnamemedewerker zal u verder de nodige informatie verschaffen.

U zal verder doorverwezen worden naar de Pijnkliniek (= 2<sup>de</sup> verdieping, route 52). Van zodra het uw beurt is, zal de pijnverpleegkundige u komen ophalen.

Van zodra het uw beurt is, zal de pijnverpleegkundige u komen ophalen. In de voorbereidende ruimte zal u zich moeten omkleden (OK – jasje, anti – slipkousen). Indien u reeds anti – slip kousen hebt, mag u deze meebrengen. U zal plaats mogen plaatsnemen in comfortabele en verstelbare zetels. Parameters (bloeddruk en hartritme) worden gecontroleerd, infuus wordt aangeprikt en administratieve zaken worden in orde gebracht.

Daarna begeleidt de verpleegkundige u naar de behandelruimte. De verpleegkundige helpt u op de behandeltafel om de juiste houding aan te nemen.

In de behandelruimte is naast de arts ook steeds een pijnverpleegkundige aanwezig die de arts assisteert.

### **Proefblokkade**

Na het ontsmetten van de huid, zal de arts onder röntgendoorlichting de plaats bepalen, de huid verdoven en vervolgens de naald plaatsen via de wang tot aan het zenuwknoopje (ganglion sphenopalatinum). Door middel van het inspuiten van een plaatselijke verdovingsvloeistof wordt een tijdelijke verdoving veroorzaakt.

Zo nodig zal u een lichte anesthesie of sedatie ondergaan.

### **Thermolesie:**

Na het ontsmetten van de huid zal de arts onder röntgendoorlichting de plaats bepalen, de huid verdoven en vervolgens de naald plaatsen via de wang tot aan het zenuwknoop (ganglion sphenopalatinum). Met behulp van een zwakke elektrische stroom wordt getest of de naald op de goede plaats staat. Bijna altijd gaat u kortstondig in slaap, dit omwille comfort redenen.

Door middel van het inspuiten van een plaatselijke verdovingsvloeistof wordt een tijdelijke verdoving veroorzaakt. De warmtebehandeling wordt uitgevoerd. Van zodra de naald perfect gepositioneerd is en steeds na voldoende verdoving.

Na de behandelingen wordt u opnieuw in de zetel of bed geholpen en naar de recovery ruimte gereden.

## **Recovery:**

Hier wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Hij/Zij zal enkele controles uitvoeren.

### **Proefblokkade:**

Na ongeveer 15 tot 30 minuten mag u zich opnieuw kan aankleden.  
Na een kop koffie/soep/frisdrank met versnapering mag u de pijnkliniek verlaten.

### **Thermolesie:**

Deze behandeling gaat door in de voormiddag. U wordt ontslaan uit de pijnkliniek in de loop van de namiddag of avond. Indien de arts het noodzakelijk acht (na thermolesie), is een overnachting mogelijk.

## **Napijn:**

Het kan voorkomen dat u na de thermolesie (=warmte behandeling) napijn heeft. Dit kan enkele weken aanhouden maar is altijd tijdelijk van aard. Uw behandelend arts zal u zo nodig een pijnstillers voorschrijven. Ten gevolge van de blokkade is er een kleine kans op het optreden van een doof gebied bij het gehemelte. In zeldzame gevallen treedt er een doof gevoel op bij de bovenkaak en/of de tandenrij.

## **Complicatie:**

Aansluitend aan (en tot 24 uur na) de behandeling kan er een bloedneus optreden, dit is altijd van tijdelijke aard.

Bij thermolesie is het heel zeldzaam en kan er een gestoord gevoel ter hoogte van de bovenkaak optreden. Zo dit het geval is, is dit bijna altijd van tijdelijke aard.

## Resultaat:

### Proefblokkade:

Bij ontslag op het dagziekenhuis of later op de raadpleging zal het resultaat van de proefblokkade door de arts met u besproken worden. Aan de hand van de bevindingen zal hij met u bespreken hoe het behandelplan er verder uit ziet.

De ingreep wordt zorgvuldig uitgevoerd, desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze complicaties.

## Resultaat:

Het is van belang om te weten dat het effect van de warmte behandeling pas na enkele weken kan optreden.

### Let op:

- Allergie voor jodium, latex, contrastvloeistof, medicijnen en/of pleisters dient u voor de ingreep te vermelden.
- Indien u zwanger bent of hier een vermoeden van heeft dan kunt u deze ingreep niet ondergaan vanwege het gebruik van röntgenstraling.

## Afspraak:

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder bijkomend bent geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van de Chronische Pijnkliniek of de verpleegkundige van het pijnteam.

Als u verhinderd bent voor een afspraak dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de pijnkliniek (057/ 35 61 20).

**Notities:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

