



Proefblokkade intercostaalzenuw

79.015N



057 35 61 20 (8:30 - 17:00 uur)



pijnkliniek@yperman.net



www.yperman.net

Doel van de behandeling:

Een intercostaal blok is een blokkade waarbij met behulp van een naald een zenuw die onder de rib loopt verdoofd wordt.

Vorbereiding:

- De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling.
- U dient 4 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor vast voedsel. Onder vast voedsel verstaan wij bijvoorbeeld: beschuit en/of crackers.
- En u dient 2 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor heldere vloeistoffen. Heldere dranken zijn bv. : zwarte koffie, thee, water.
- Enkel wanneer u diabetes hebt, mag u na overleg met uw arts een lichte maaltijd 2 uur voor in de ingreep nuttigen
- Het is niet toegestaan de dag van ingreep zelf met de wagen te rijden. Er zal een begeleider moeten voorzien worden op de dag van de ingreep. Gelieve dit ook kenbaar te maken bij de aanvang van de dag opname.

Medicatie:

Uw thuismedicatie mag u zoals gewoonlijk innemen met uitzondering van bloed verdunnende medicijnen. Uw behandelend arts van de pijnkliniek zal u hierover informeren. Eventueel zal de arts voor u een aanvullend labo - onderzoek aanvragen. De uitslag is dan bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Acetylsalicylzuur (Asaflow®, Cardioaspirine®...) mag verder genomen worden, tenzij anders vermeld door de pijnarts.

Behandeling:

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan met uw identiteitskaart aan de automatische check - in balie, waarna u zal doorverwezen worden naar een onthaalmedewerker. De opnamemedewerker zal u verder de nodige informatie verschaffen.

U zal verder doorverwezen worden naar de Pijnkliniek (= 2^{de} verdieping, route 52). Van zodra het uw beurt is, zal de pijnverpleegkundige u komen ophalen.

In de voorbereidende ruimte zal u zich moeten omkleden (Ok -jasje, anti – slipkousen). Indien u reeds anti – slip kousen hebt, mag u deze meebrengen. U zal plaats mogen nemen in comfortabele en verstelbare zetels. Parameters worden gecontroleerd, infuus wordt aangeprikt en administratieve zaken worden in orde gebracht.

Daarna begeleidt de verpleegkundige u naar de behandelruimte. De verpleegkundige helpt u bij aannemen van de juiste houding op de behandeltafel.

In de behandelruimte is naast de arts ook steeds een pijnverpleegkundige aanwezig die de arts assisteert.

Na het ontsmetten van de huid zal de arts onder röntgendoorlichting of met behulp van een echo de plaats bepalen, de huid verdoven en vervolgens de naald plaatsen. Door middel van het inspuiten van een plaatselijke verdovingsvloeistof wordt een tijdelijke verdoving veroorzaakt.

Na de behandeling wordt u opnieuw in de zetel geholpen en wordt u terug naar de voorbereidingsruimte/ recovery gebracht

Recovery:

Hier wordt u opgevolgd door een pijnverpleegkundige. Hij/Zij zal enkele controles uitvoeren. Na ongeveer 15 tot 30 minuten mag u zich opnieuw aankleden. Na een kop koffie/soep/frisdrank met versnapering mag u de pijnkliniek verlaten.

Resultaat:

Op de recovery of later op de controleraadpleging zal het resultaat van de proefblokkade door de arts met u besproken worden. Aan de hand van de bevindingen zal hij met u bespreken hoe het behandelplan er verder uit ziet.

Complicaties:

Tijdens de ingreep kan als mogelijke complicatie het longvlies geraakt worden waardoor een klaplong kan ontstaan (=pneumothorax). De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze complicatie.

Let op:

- Allergie voor jodium, contrastvloeistof, medicijnen en/of pleisters dient u voor de ingreep te vermelden.
- Indien u zwanger bent of hier een vermoeden van heeft, kunt u deze behandeling niet ondergaan vanwege de röntgenstralen.

Afspraak:

Als u voor een afspraak verhinderd bent dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de pijnkliniek: **057 35 61 20**.

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder bijkomend bent geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van de pijnkliniek.