



Bloc test d'un nerf intercostal

79.016F



057/35 61 20 (8 h 30 – 17 h)



pijnkliniek@yperman.net



www.yperman.net

Objectif du traitement :

Un bloc intercostal est une technique grâce à laquelle on endort un nerf qui passe sous la côte, à l'aide d'une aiguille.

Préparation :

- La préparation dépend de l'heure du traitement.
- Vous devez être à jeun 4 heures avant le traitement pour l'alimentation solide. Nous entendons par alimentation solide une biscotte et/ou des crackers.
- Vous devez être à jeun 2 heures avant le traitement pour les liquides clairs. Exemples de liquides clairs : café noir, thé, eau.
- Si vous êtes diabétique, vous pouvez prendre un repas léger 2 heures avant l'intervention, moyennant l'accord de votre médecin.
- Vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule le jour de l'intervention. Il faut donc prévoir une personne pour vous accompagner ce jour-là. Veuillez dès lors le signaler dès le début de l'hospitalisation de jour.

Traitement médicamenteux :

Vous pouvez prendre vos médicaments à domicile comme d'habitude, à l'exception des anticoagulants. Votre médecin à la Clinique de la douleur vous informera à ce sujet. Il demandera éventuellement des examens de laboratoire complémentaires. Les résultats détermineront si le traitement peut avoir lieu ou pas.

Vous pouvez continuer à prendre de l'acide acétylsalicylique (Asaflow[®], Cardioaspirine[®]...), sauf indication contraire de votre médecin algologue.

Traitement :

Le jour du traitement, vous vous présenterez avec votre carte d'identité au guichet d'enregistrement automatique, après quoi vous serez dirigé(e) vers un membre du personnel d'accueil. Le responsable des admissions vous fournira ensuite les informations nécessaires.

Vous serez ensuite dirigé(e) vers la Clinique de la douleur (= 2^e étage, route 52). Lorsque votre tour viendra, l'infirmier/-ière algologue viendra vous chercher.

Vous devrez vous changer dans la salle de préparation et enfiler la blouse de chirurgie et les bas antidérapants. Si vous possédez déjà des bas antidérapants, vous pouvez les apporter. Vous vous assierez dans un fauteuil confortable et réglable. Vos paramètres seront contrôlés, on posera la perfusion et réglera les questions administratives.

L'infirmier/-ière vous conduira ensuite à la salle de soins. L'infirmier/-ière vous aidera à vous installer correctement sur la table de traitement.

Dans la salle de soins, un ou une infirmier/-ière en algologie assiste le médecin algologue en permanence.

Après la désinfection de la peau, le médecin déterminera le site de ponction par une radiographie ou une échographie, anesthésiera la peau et insérera ensuite l'aiguille. L'injection d'un anesthésique local entraînera alors une anesthésie temporaire.

Après le traitement, vous prendrez à nouveau place dans le fauteuil et serez ramené(e) à la salle de préparation/de réveil.

Réveil :

Ici, vous serez pris(e) en charge par un(e) infirmier/-ière en algologie, qui réalisera quelques contrôles. Vous pourrez vous rhabiller après 15 à 30 minutes environ.

Après avoir pris une tasse de café, une soupe ou une boisson fraîche avec une collation, vous pourrez quitter la Clinique de la douleur.

Résultat :

En salle de réveil ou plus tard en consultation de contrôle, votre médecin discutera du résultat du traitement avec vous. À l'aide des observations, il vous expliquera en quoi consistera la suite du traitement.

Complications :

Une lésion de la plèvre, entraînant un pneumothorax, est une complication possible lors de ce traitement.

Bien que le traitement soit effectué avec soin, il existe cependant un risque faible que cette complication survienne.

Attention :

- Vous devez signaler toute allergie à l'iode, aux produits de contraste, à des médicaments et/ou au sparadrap avant l'intervention.
- Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, vous ne pouvez pas bénéficier de ce traitement en raison des rayons X.

Rendez-vous :

Si vous ne pouvez venir à un rendez-vous, veuillez avoir l'obligeance de téléphoner au secrétariat de la Clinique de la douleur : **057 35 61 20**.

Nous espérons que vous avez trouvé dans cette brochure toutes les informations dont vous aviez besoin. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous adresser aux médecins ou au personnel infirmier de la Clinique de la douleur.