

Plexus coeliacus blokkade

79.035N



057 35 61 20 (8:30 - 17:00 uur)



pijnkliniek@yperman.net



www.yperman.net

Doel van de behandeling:

Deze behandeling wordt toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van een gezwel van organen in de bovenbuik. De organen kunnen zijn de alvleesklier (=pancreas), de maag en de lever. Bij de behandeling wordt het zenuwnetwerk (=plexus coeliacus) in de bovenbuik geblokkeerd. Het geeft over het algemeen een goede vermindering van de pijnklachten en het effect houdt gemiddeld enkele maanden aan.

Vorbereiding:

- De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling.
- U dient 4 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor vast voedsel.
- En u dient 2 uur voor de behandeling nuchter te zijn voor heldere vloeistoffen.
- Onder vast voedsel verstaan wij bijvoorbeeld: beschuit en/of crackers.
- Onder heldere vloeistoffen verstaan wij: water, thee en zwarte koffie.
- Enkel wanneer u diabetes hebt, mag u na overleg met uw arts een lichte maaltijd voor in de ingreep nuttigen.
- Het is niet toegestaan de dag van ingreep zelf met de wagen te rijden. Er zal een begeleider moeten voorzien worden op de dag van de ingreep. Gelieve dit dan ook kenbaar te maken voor de aanvang van de dagopname.

Medicatie:

Uw thuismedicatie mag u zoals gewoonlijk innemen met uitzondering van bepaalde bloedverdunnende medicijnen gebruikt dan mag u deze een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. Uw behandelend arts van de pijnkliniek zal u hierover informeren. Eventueel zal de arts voor u een aanvullend laboratorium onderzoek aanvragen. De uitslag is dan bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Acetylsalicylzuur (Asaflow®, Cardioaspirine®...) mag verder genomen worden, tenzij anders vermeld door uw pijnarts.

Behandeling:

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan met uw identiteitskaart aan de automatische check-in balie, waarna u zal doorverwezen worden naar een onthaalmedewerker. De opnamemedewerker zal u verder de nodige informatie verschaffen.

U zal verder doorverwezen worden naar de Pijnkliniek (= 2^{de} verdieping, route 52). Van zodra het uw beurt is zal de pijnverpleegkundige u komen ophalen.

In de voorbereidende ruimte zal u zich moeten omkleden (OK – jasje, anti – slipkousen). Indien u reeds anti – slip kousen hebt, mag u deze meebrengen. U zal plaats mogen nemen in comfortabele en verstelbare zetels. Parameters (bloeddruk en hartritme) worden gecontroleerd, infuus wordt aangeprikt en administratieve zaken worden in orde gebracht. Daarna begeleidt de verpleegkundige u naar de behandelruimte. De verpleegkundige helpt u bij de juiste houding op de behandeltafel.

In de behandelruimte is naast de arts ook steeds een pijnverpleegkundige aanwezig die de arts assisteert.

Na het ontsmetten van de huid zal de arts zal onder röntgenstralen of met behulp van een echo de plaats bepalen, (de huid verdoven) en de naald opschuiven tot in het zenuwnetwerk van de bovenbuik. Vervolgens worden de medicijnen door de naald gespoten. Na de ingreep gaat u naar de recovery ruimte waar de verpleegkundige enkele controles zal uitvoeren. Hier vandaan gaat u terug naar de verpleegafdeling. Uw behandelend arts zal u daar opzoeken.

Recovery:

Hier wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Hij/Zij zal enkele controles uitvoeren.

Napijn:

Het kan voorkomen dat u na de behandeling napijn heeft. Uw behandelend arts zal hier omtrent informeren en indien nodig een pijnstiller voorschrijven.

Resultaat:

Het is goed om te weten dat het resultaat van de behandeling na 1 à 2 dagen duidelijk wordt. Deze ingreep gaat door in de voormiddag en mag u 's avonds de pijnkliniek verlaten. Op advies van de arts kan een één overnachting noodzakelijk zijn.

Complicatie:

Het kan voorkomen dat u na de ingreep last heeft van:

- diarree
- duizeligheid bij opstaan (hypotensie)

Deze complicaties zijn tijdelijk.

Als uiterst zeldzame complicaties kunnen optreden:

- dwarslaesie (=gedeeltelijke verlamming)
- verminderde functie van de blaas

Alle eventueel optredende complicaties dient u bij uw behandelend arts te melden.

Let op:

- Allergie voor jodium, latex, contrastvloeistof, medicijnen en/of pleisters dient u voor de behandeling te vermelden.

Afspraak:

Als u voor een afspraak verhinderd bent, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met de het secretariaat van de pijnkliniek **057 35 61 20**

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder bijkomend geïnformeerd bent.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van de pijnkliniek.