



Dépistage et décolonisation pré- opératoire du SARM

INTERVENTION VIA L'HÔPITAL DE JOUR

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Vous vous présentez à la consultation préopératoire parce que vous allez bientôt faire l'objet d'une intervention via l'hôpital de jour.

Dans ce cadre, nous consacrons une attention particulière à la bactérie nosocomiale **SARM**.

Notre souci est en effet de veiller à ce que la phase postopératoire se déroule de façon optimale et d'éviter au maximum les complications, telles que des infections par le SARM. En outre, nous souhaitons éviter la propagation du SARM au sein de notre hôpital.

Étant donné que vous êtes connu chez nous comme étant porteur du SARM, vous allez faire l'objet d'une décolonisation afin d'éliminer ce SARM (c'est ce que l'on appelle une décolonisation du SARM).

Qu'est-ce que le SARM ?

Le **SARM** est le **S**taphylococcus **A**ureus **R**ésistant à la **M**éthicilline. Les staphylocoques sont des bactéries présentes naturellement chez de nombreuses personnes, principalement dans le nez et sur la peau.

Le SARM est une variante de cette bactérie et n'est plus sensible aux antibiotiques classiques. Si vous n'êtes que porteur de cette bactérie dans le nez ou sur la peau, ce germe ne causera que peu de désagrément, à l'instar du staphylocoque ordinaire. Il n'y a donc **aucun danger** pour les **personnes en bonne santé**.

Cette bactérie peut toutefois aussi se propager sur d'autres parties du corps, comme la vésicule, les poumons et une plaie ouverte. Elle peut en outre se propager vers d'autres patients.

Le SARM peut constituer un danger pour les personnes dont la résistance est sérieusement diminuée et pour celles qui ont été récemment opérées ou doivent l'être. Une infection par le SARM complique ou ralentit le processus de guérison.

La décolonisation?

La décolonisation doit être démarrée cinq jours avant l'intervention. Si l'intervention a lieu dans moins de 5 jours, la décolonisation doit être commencée malgré tout, mais sera simplement plus courte.

En pré-op, les produits suivants sont mis à votre disposition :

- Savon désinfectant (Hibiwash®)
- Baume nasal désinfectant (Bactroban®)
- Comprimés pour la gorge (Angiocine®)

La décolonisation se déroule comme suit :

De 5 jours avant l'intervention au jour même :

- ☐ Utiliser des serviettes et gants de toilette propres chaque jour
- ☐ Changer votre linge de lit avant de commencer la décolonisation
- ☐ Le matin, lavez-vous entièrement (chaque partie du corps) à l'aide du savon désinfectant (Hibiwash®)
- ☐ Aux jours 1 et 4, les cheveux doivent être lavés avec le même savon.
- ☐ Appliquez trois fois par jour un peu (taille d'une tête d'allumette) de baume nasal désinfectant (Bactroban®) à l'aide d'un coton-tige à l'entrée de chaque narine, massez pour faire pénétrer.




Schéma de décolonisation

Jour	Baume nasal (Bactroban®) + comprimés (Angiocine®)	Laver les mains (Hibiscrub®)	Laver les cheveux (Hibiscrub®)
1	8 h 14 h 20 h	8 h	8 h
2	8 h 14 h 20 h	8 h	
3	8 h 14 h 20 h	8 h	
4	8 h 14 h 20 h	8 h	8 h
5	8 h 14 h 20 h	8 h	

Des questions ?

Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours vous adresser à votre médecin traitant ou le team hygiène au centre hospitalier.
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement.

Cordialement,

Équipe Hygiène hospitalière ☎ 057 35 70 46

Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net