








Uw therapie: Taxol-Herceptin- Perjeta

94.051N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

1. Wat zijn Taxol (paclitaxel), Herceptin (trastuzumab) en Perjeta (pertuzumab)?

Taxol® is een vorm van chemotherapie. We verwijzen hiervoor naar de brochure Taxol®.

Herceptin® (trastuzumab) en Perjeta® (pertuzumab) zijn monoklonale antilichamen (antistoffen) die doelgericht kwaadaardige cellen remmen door zich te hechten aan bepaalde eiwitten die vooral aanwezig zijn op de wand van de tumorcellen. Door deze doelgerichte therapie wordt er minder schade veroorzaakt bij de gezonde lichaamscellen, waardoor er minder bijwerkingen optreden dan bij chemotherapie.

2. Wanneer behandelen met Herceptin® en Perjeta®??

U komt enkel in aanmerking voor een behandeling met Herceptin® en/of Perjeta® wanneer er een overexpressie van het “HER-2neu” eiwit aanwezig is op de tumorcellen, ook wel de “Humaan Epidermale groeifactor Receptor 2” genoemd. Dit komt onder andere voor bij sommige vormen van borstkanker. Het pathologieverslag geeft hier uitsluitsel over.

De arts kan beslissen om enkel Herceptin® toe te dienen of Herceptin® in combinatie met Perjeta®, al dan niet in combinatie met chemotherapie, vb Taxol.

3. Behandelingsschema: hoe worden Herceptin® (trastuzumab) – Perjeta® (pertuzumab) toegediend?

Herceptin® en Perjeta® worden 18 maal om de 3 weken toegediend. Perjeta® wordt altijd IV (intraveneus) toegediend. Bij Herceptin® bestaat de mogelijkheid om dit zowel IV (intraveneus) of SC (subcutaan, onderhuidse inspuiting) toe te dienen.

Taxol wordt wekelijks toegediend. Zie ook brochure Taxol®.

De toedieningen gebeuren op het internistisch dagziekenhuis.

Taxol wekelijks Herceptin 3-wekelijks (+/-Perjeta® 3-wekelijks)	Week 1 Plaatsen PAC Bloedafname Toediening 1.1 Taxol® Herceptin® (Perjeta®)	Week 2 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 1.8 Taxol®	Week 3 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 1.15 Taxol®	Week 4 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 2.1 Taxol® Herceptin® (Perjeta®)	Week 5 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 2.8 Taxol®	Week 6 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 2.15 Taxol®
	Week 7 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 3.1 Taxol® Herceptin® (Perjeta®)	Week 8 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 3.8 Taxol®	Week 9 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 3.15 Taxol®	Week 10 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 4.1 Taxol® Herceptin® (Perjeta®)	Week 11 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 4.8 Taxol®	Week 12 Bloedafname dag -1 of 1 Toediening 4.15 Taxol®

Week 13 Bloedafname dag Toediening 5 Herceptin® (Perjeta®)	Week 16 Bloedafname dag Toediening 6 Herceptin® (Perjeta®)	Week 19 Bloedafname dag Toediening 7 Herceptin® (Perjeta®)	Week 22 Bloedafname dag Toediening 8 Herceptin® (Perjeta®)	Week 25 Bloedafname dag Toediening 9 Herceptin® (Perjeta®)	Week 28 Bloedafname dag Toediening 10 Herceptin® (Perjeta®)	Week 31 Bloedafname dag Toediening 11 Herceptin® (Perjeta®)
Week 34 Bloedafname dag Toediening 12 Herceptin® (Perjeta®)	Week 37 Bloedafname dag Toediening 13 Herceptin® (Perjeta®)	Week 40 Bloedafname dag Toediening 14 Herceptin® (Perjeta®)	Week 43 Bloedafname dag Toediening 15 Herceptin® (Perjeta®)	Week 46 Bloedafname dag Toediening 16 Herceptin® (Perjeta®)	Week 49 Bloedafname dag Toediening 17 Herceptin® (Perjeta®)	Week 52 Bloedafname dag Toediening 18 Herceptin® (Perjeta®)

Aandachtspunten:


- Haarverlies
- Smaak- en reukveranderingen
- Ontsteking mondslijmvlies (vb. aften)
- Irritatie ogen

- Verminderde hartfunctie

- Verminderde eetlust
- Misselijkheid en/of braken
- Moeilijke stoelgang (constipatie)

- Onderdrukking van het beenmerg met als gevolg:
 - verminderd aantal witte bloedcellen (koorts, infectierisico)
 - verminderd aantal rode bloedcellen (vermoeidheid)
 - verminderd aantal bloedplaatjes (blauwe plekken, makkelijker bloeden)

- Invloed op de seksualiteit en intimiteit



4. Wat als u last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak tijdig meldt. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts en/of thuisverpleegkundige. Indien nodig zal de huisarts u doorverwijzen naar het ziekenhuis. Bij vragen kunt u eveneens contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met de borstkliniek. Telefoonnummers vindt u achteraan in de brochure.

Bij het optreden van volgende klachten raden wij u aan zich aan te melden via de spoedopname:

- Koorts, 1 maal hoger dan 38.5°C of 2 maal hoger dan 38°C met 1 uur tussen
- U moet langer dan 2 dagen braken
- U hebt last van kortademigheid of pijn in de borststreek
- Bij twijfel, indien u niemand anders kon bereiken

5. Nuttige telefoonnummers:

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- Borstkliniek
057 35 67 30
- Intern Dagziekenhuis
057 35 62 61
- Verpleegafdeling Oncologie
057 35 64 41
- Algemeen telefoonnummer Jan
Yperman Ziekenhuis
057 35 35 35

