

Schéma

Zometa® est administré à l'hôpital de jour, en goutte-à-goutte dans une veine, pendant au moins 15 minutes ; il doit être administré en solution séparée, par perfusion séparée dans une veine (intraveineuse). Chez les personnes âgées ou ayant des problèmes rénaux, la durée de la perfusion peut être allongée à 45 minutes. Et si vous avez des réactions, une administration plus lente de Zometa® peut être une solution également.

Déroulement

Zometa® est administré par voie intraveineuse (par perfusion). Dans le cadre du traitement de métastases osseuses, l'administration de Zometa® s'effectue toutes les 4 semaines. Pour un traitement préventif après un cancer du sein, Zometa® est administrée 2x/an.

Vu que ce traitement est administré de jour, vous ne devez pas apporter de vêtements de nuit. Vous ne devez pas être à jeun, un repas léger peut être indiqué ce jour-là pour éviter les nausées. Avant de commencer le traitement, le médecin fera des analyses de sang et évaluera votre réaction à intervalles réguliers.

Traitement

La substance active de Zometa® est l'acide zolédronique, qui appartient à un groupe de substances appelées bisphosphonates. L'acide zolédronique agit en se liant à l'os et en modifiant la vitesse du changement osseux. Il est utilisé :

- Pour éviter les complications osseuses, par exemple des fractures, chez des patients adultes ayant des métastases osseuses (le cancer s'est propagé du site initial aux os) et des personnes atteintes de la maladie de Kahler ou de myélome multiple.
- Chez des patients adultes pour réduire la quantité de calcium dans le sang lorsque celle-ci est trop élevée en raison de la présence d'une tumeur. Les tumeurs peuvent accélérer la modification normale des os, ce qui peut entraîner une augmentation de la libération de calcium par l'os.
- Administration préventive de Zometa® après un diagnostic de cancer du sein.

Les effets indésirables fréquents peuvent être :

- Maux de tête.
- Nausées et vomissements.
- Faible taux de calcium dans le sang.
- Peu de globules rouges.
- Graves problèmes rénaux.

Les effets indésirables moins fréquents peuvent être :

- Réaction allergique.
- Tension artérielle basse.
- Douleur dans la poitrine.
- Somnolence.
- Prise de poids.
- Confusion.
- Rythme cardiaque irrégulier.
- Douleur dans la bouche, aux dents et/ou à la mâchoire.

Le prix de 1 flacon de Zometa® s'élève à **110,58 €**.

**En cas de problèmes,
n'hésitez pas à prendre contact avec votre
médecin traitant.**

Hôpital de jour interne : 057 35 62 61

Clinique du sein : 057 35 67 30

Unité de soins : 057 35 64 41

Numéro de téléphone général JYZ : 057 35 35 35

Centre hospitalier Jan Yperman

Briekestraat 12 • 8900 Ieperwww.yperman.net • 057 35 35 35

info@yperman.net •     