








Taxol wekelijks

94.061N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

1. Wat is Taxol® (paclitaxel)?

Taxol® of paclitaxel is een celremmend geneesmiddel, in de categorie chemotherapie of cytostatica.

2. Wanneer behandelen met Taxol®?

Taxol® wordt onder andere toegediend bij patiënten met borstkanker. De behandeling kan volgen op een operatie (ook wel “adjuvante” chemotherapie genoemd), maar kan ook vóór de operatie worden toegediend (“neo-adjuvante” chemotherapie). De keuze van een voor- of nabehandeling is afhankelijk van meerdere factoren. Deze worden met u besproken door uw behandelende arts

3. Behandelingsschema: hoe wordt Taxol® toegediend?

Taxol® wordt 12x intraveneus (IV) toegediend op het intern dagziekenhuis, dit in een wekelijks schema :

Taxol® wekelijks	Week 1 Plaatsen PAC Bloedafname Eerste toediening Taxol®	Week 2 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 3 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 4 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 5 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 6 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®
	Week 7 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 8 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 9 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 10 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 11 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®	Week 12 Bloedafname dag 1 of -1 Toediening Taxol®

Het infuus wordt aangeschakeld via een poortkatheter (PAC). Een PAC is een kleine aanprikpoort die operatief, onderhuids, wordt geplaatst. Dit poortsysteem wordt ofwel tijdens de (borst)operatie of ten laatste op de eerste dag van de therapie geplaatst door de chirurg.

Indien u tijdens of na het inlopen van de chemotherapie pijn of irritatie ervaart, dient u dit onmiddellijk te melden aan de verpleegkundige of arts op het dagziekenhuis.

4. Ondersteunende medicatie tijdens de behandeling:

- Op de dag van de therapie (=dag 1) krijgt u op het dagziekenhuis Solu-Medrol® 40mg, Zantac® 50mg IV en 1 comprimé Cetrizine® 10mg. Deze medicatie dient om eventuele allergische reacties te voorkomen.
- Bij klachten van misselijkheid mag u thuis Litan® 50 mg innemen tot 6x/dag (6x 1 comprimé of 3x 2 comprimés).
- Om ontsteking van de mond te voorkomen wordt aangeraden de mond 2x/dag te spoelen met PerioAid®. Grondig spoelen, uitspuwen en nadien tanden poetsen met een zachte tandenborstel (om verkleuring van tanden te voorkomen).

Indien dit onvoldoende blijkt en er toch tekenen van ontsteking optreden schakelt u het beste over op een stomatitis cocktail (witte vloeistof die mond en keel verdooft, ontsmet en die ook wat maagbeschermer bevat). De stomatitis cocktail mag 6x/dag worden gebruikt (spoelen mond), en max 4x/dag worden doorgeslikt (na spoelen best een ½ tot 1 uur wachten om iets te drinken of te eten omdat mond/keel wat gevoelloos kunnen zijn door het verdovende, pijnstillende bestanddeel).


5. Aandachtspunten bij de therapie:

Een allergische reactie op Taxol® kan af en toe voorkomen. Dit kan enerzijds onmiddellijk optreden en uit zich in een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, rillingen of huiduitslag tijdens of kort na het inlopen van de chemotherapie. Soms kan het nodig zijn om de chemotherapie tijdelijk te onderbreken. Anderzijds kan een allergie zich ook uiten onder de vorm van een huiduitslag die later optreedt. Uw arts kan indien nodig hiervoor medicatie voorschrijven.

Tijdens de toediening van Taxol® zal men de handen en voeten koelen. Dit vermindert de kans op tintelingen ter hoogte van handen en voeten.

6. Mogelijke bijwerkingen:

- Haarverlies
- Smaak- en reukveranderingen
- Ontsteking mondslijmvlies (vb. aften)
- Buikloop of diarree
- Onderdrukking van het beenmerg met als gevolg:
 - verminderd aantal witte bloedcellen (koorts, infectierisico)
 - verminderd aantal rode bloedcellen (vermoeidheid)
 - verminderd aantal bloedplaatjes (blauwe plekken, gemakkelijker bloeden)
- Tintelingen of voor gevoel in vingertoppen en/of tenen
- Grieperig gevoel, vooral spier –en gewrichtspijn
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit



7. Wat als u last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak tijdig meldt. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts en/of thuisverpleegkundige. Indien nodig zal de huisarts u doorverwijzen naar het ziekenhuis. Bij vragen kunt u eveneens contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met de borstkliniek. Telefoonnummers vindt u achteraan in de brochure.

Bij het optreden van volgende klachten raden wij u aan zich aan te melden via de spoedopname:

- Koorts, 1 maal hoger dan 38.5°C of 2 maal hoger dan 38°C met 1 uur tussen
- U moet langer dan 2 dagen braken
- U hebt last van kortademigheid of pijn in de borststreek

8. Nuttige telefoonnummers:

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- Borstkliniek
057 35 67 30
- Intern Dagziekenhuis
057 35 62 61
- Verpleegafdeling Oncologie
057 35 64 41
- Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis
057 35 35 35