




Taxol hebdomadaire

94.062F

Centre hospitalier Jan Yperman • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net • 

1. Qu'est-ce que Taxol® (paclitaxel) ?

Le Taxol® ou paclitaxel est un médicament qui freine la division des cellules, repris dans la catégorie chimiothérapie ou 'cytostatiques'.

2. Quand traite-t-on par Taxol® ?

Taxol® est administré entre autres en cas de cancer du sein. Le traitement peut être administré après une opération (on parle aussi de chimiothérapie « adjuvante »), mais il peut aussi être administré avant la chirurgie (chimiothérapie « néoadjuvante »). Le choix de l'administration avant ou après la chirurgie dépend de plusieurs facteurs, qui seront analysés par votre médecin traitant.

3. Schéma de traitement : comment Taxol® est-il administré ?

Taxol® est administré 12 fois par voie intraveineuse (IV) à l'hôpital de jour médical, selon un schéma hebdomadaire (= toutes les semaines) :

Taxol® hebdomadaire	Semaine 1 Mise en place du PAC Prise de sang Première administration Taxol®	Semaine 2 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 3 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 4 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 5 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 6 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®
	Semaine 7 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 8 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 9 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 10 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 11 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®	Semaine 12 Prise de sang jour 1 ou -1 Administration Taxol®

La perfusion est connectée via un cathéter Port-a-Cath (PAC). Un PAC est un petit boîtier qui est placé chirurgicalement sous la peau. Ce système est mis en place par un chirurgien, soit pendant l'opération (du sein), soit au plus tard le premier jour du traitement. **Pendant ou après la perfusion de chimiothérapie, si vous ressentez des douleurs ou une irritation, vous devez le signaler immédiatement à l'infirmier/ère ou au médecin de l'hôpital de jour.**

4. Médicaments de soutien pendant le traitement :

- Le jour du traitement (= jour 1), vous recevrez, à l'hôpital de jour, du Solu-Medrol® 40 mg, du Zantac® 50 mg IV et 1 comprimé de Cetrizine® 10 mg. Ces médicaments visent à éviter une éventuelle réaction allergique.
- De retour chez vous, si vous souffrez de nausées, vous pourrez prendre du Litan® 50 mg jusqu'à 6 x/jour (6 x 1 comprimé ou 3 x 2 comprimés).
- Pour éviter une inflammation de la bouche, il est conseillé de vous rincer la bouche 2x/jour avec du PerioAid®. Rincez-vous soigneusement la bouche, crachez, puis

brossez-vous les dents avec une brosse à dents souple (pour éviter toute coloration des dents).

Si cela ne suffit pas et si vous développez malgré tout des signes d'inflammation, il est préférable de passer à un cocktail contre les stomatites (un liquide blanc qui endort la bouche et la gorge, désinfecte et contient également un protecteur gastrique). Le cocktail contre les stomatites peut être utilisé 6 x/jour (en bain de bouche), et il peut être avalé maximum 4 x/jour (après le bain de bouche, il est préférable d'attendre ½ heure à 1 heure avant de boire ou de manger, parce que la bouche/la gorge peuvent être insensibilisées par le produit anesthésique/antidouleur).

5. Points importants lors du traitement :

Une réaction allergique au Taxol® peut parfois être observée. Cette réaction peut survenir immédiatement, et se manifeste par une sensation d'oppression, une tension artérielle basse, des frissons ou une éruption cutanée pendant ou peu après la perfusion de chimiothérapie. Parfois, il peut être nécessaire d'interrompre temporairement la chimiothérapie. D'autre part, une allergie peut également se manifester sous la forme d'une éruption cutanée, qui survient plus tard. Si nécessaire, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour ceci.

Pendant l'administration de Taxol®, on refroidira vos mains et vos pieds. Ceci réduit le risque de picotements au niveau des mains et des pieds.

6. Effets indésirables possibles :


- Perte de cheveux
- Modifications du goût et de l'odorat
- Inflammation de la muqueuse buccale (p.ex. aphtes)

- Diarrhée

- Suppression de la moelle osseuse, entraînant :
 - diminution du nombre de globules blancs (fièvre, risque d'infection)
 - diminution du nombre de globules rouges (fatigue)
 - diminution du nombre de plaquettes (hématomes, tendance aux saignements)

- Picotements au bout des doigts et/ou aux orteils

- État grippal, surtout douleurs musculaires et articulaires
- Influence sur la sexualité et l'intimité



7. Que faire si vous souffrez d'effets indésirables ?

Il est important de signaler à temps toute anomalie ou tout inconfort. Adressez-vous en premier lieu à votre généraliste et/ou à l'infirmier/ère à domicile. Si nécessaire, votre généraliste vous orientera vers l'hôpital. Si vous avez des questions, vous pouvez également contacter l'hôpital de jour interne ou la clinique du sein. Vous trouverez les numéros de téléphone à l'arrière de cette brochure.

Si vous présentez les symptômes suivants, nous vous recommandons de vous rendre aux urgences :

- Vous avez de la fièvre : 1 fois > 38,5 °C ou 2 fois > 38 °C à 1 heure d'intervalle
- Vous souffrez de vomissements pendant plus de 2 jours
- Vous êtes essouffé(e)/vous avez mal dans la poitrine

8. Numéros de téléphone utiles :

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter les personnes suivantes :

- Clinique du sein
057 35 67 30
- Hôpital de jour médical
057 35 62 61
- Département infirmier d'Oncologie
057 35 64 41
- Numéro général du Centre hospitalier Jan Yperman
057 35 35 35