








Carboplatine/ Pemetrexed

94.065N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

1. Wat is Carboplatine/Pemetrexed en hoe werkt het?

Carboplatinum/Pemetrexed ook wel Carbo/Alimta® genoemd, is een chemotherapie die bestaat uit twee geneesmiddelen: Carboplatine (=Paraplatin®, Carboplatine®, Carboplatinum®) en Pemetrexed (=Alimta®). Het wordt gebruikt voor de behandeling van grootcellige longtumoren.

Chemotherapie is een medicijn die kankercellen doodt of hun celdeling afremt. Hierdoor kan de kanker genezen of kan een tumor kleiner worden.

2. Hoe wordt het toegediend?

Carbo/Alimta wordt toegediend via een infuus en verloopt volgens een cyclus van 21 dagen. Dit betekent dat, als u telt vanaf de eerste dag van de cyclus, u zich na 21 dagen opnieuw op dag 1 van de cyclus bevindt.

3. Verloop van de behandeling:

Voor het starten van de therapie is het noodzakelijk om zeker één week voordien 1 inspuiting vitamine B12® te krijgen en om dagelijks gedurende gans de therapie 1 co. Folavit® 0,4mg in te nemen. De inspuiting Vitamine B12 zal om de 9 weken herhaald worden. Deze medicatie is nodig om de toxiciteit van de therapie te verminderen.

Thuis dient u ook steeds Cortisone (Medrol®) in te nemen om de nevenwerkingen te verminderen als volgt :


- De dag voor de chemotherapie : 3/4de van een comprimé van 32 mg. Medrol®. Dit is dus gelijk aan 24 mg. In te nemen om 8 uur en 18 uur.
- De dag van de chemotherapie : 3/4de van een comprimé van 32 mg (= 24 mg.) Om 18u.
- De dag na de chemotherapie : 3/4de van een comprimé van 32 mg. (=24mg.) Telkens om 8 u en 18u.

Volgende tabel toont een overzicht van het verloop van de therapie. De behandeling start steeds met een spoelinfluus om uw nieren beter te beschermen.

	Ziekenhuis
Wat?	Dag 1
Carboplatine (Paraplatin®)	x
Pemetrexed (Alimta®)	x

Naast de chemotherapie zult u ook nog ondersteunende medicatie krijgen om minder nevenwerkingen te hebben en om de chemo beter op te nemen. (Cortisone, anti-emetica,...) Deze medicatie kan echter bijwerkingen veroorzaken zoals maaglast, slaapmoeilijkheden, stemmingswisselingen en verhoogde eetlust. Toch is het belangrijk dat u deze medicatie inneemt zodat u de therapie beter verdraagt. Bespreek deze klachten met uw zorgverleners.

4. Mogelijke bijwerkingen



Indien er zich 1 of meerdere bijwerkingen voordoen, moet u contact opnemen met de huisarts en/of de thuisverpleegkundige. Bij vragen kan u contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met een gespecialiseerde dienst. Telefoonnummers vindt u achteraan de brochure. Tevens zijn er tips beschikbaar om de bijwerkingen aan te pakken. Vraag er gerust naar.

5. Carboplatine/Pemetrexed en andere medicatie:

Tijdens de behandeling mag u geen NSAID's (vb. Voltaren®, Brufen®, Feldene®, Ibuprofen®, Diclofenac®,...) gebruiken gedurende 2 dagen voor, op en 2 dagen na de toediening van de chemotherapie om nierproblemen te voorkomen. Bespreek met uw arts als u deze medicatie neemt en of u een alternatief nodig hebt.

6. Wat als je last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak meldt aan een arts. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Bij het optreden van volgende klachten komt u onmiddellijk naar de spoedafdeling:

- U hebt koorts: 1 maal $>38,5^{\circ}\text{C}$ of 2 maal $> 38^{\circ}\text{C}$ met 1 uur tijdsverschil
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek

7. Nuttige telefoonnummers

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- **De onco-verpleegkundige**
057 35 67 35
- **Intern oncologisch dagziekenhuis**
057 35 62 61
- **Verpleegafdeling Oncologie**
057 35 64 41
- **Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis**
057 35 35 35