




Topotecan

94.069N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net • 

1. Wat is Topotecan en hoe werkt het?

Topotecan, ook wel Hycamtin® genoemd, is een celremmend geneesmiddel die zowel in pilvorm als in infuus kan worden toegediend.

2. Wanneer behandelen met Cisplatine/Etoposide?

Topotecan wordt toegediend bij de behandeling van kleincellige longkanker en bij eierstokkanker. Het wordt ook gebruikt bij baarmoederhalskanker in combinatie met een ander middel, Cisplatine®

3. Verloop van de behandeling

Uw arts beslist of Topotecan in pilvorm of via een infuus wordt gegeven.

1. Topotecan (Hycamtin®) in pilvorm


Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. Tijdens de eerste 5 dagen van elke cyclus neemt u één keer per dag Topotecan. Na de 5e dag neemt u geen Topotecan meer, tot de start van de volgende cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten.

Generieke Naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1-5	6-21	
Topotecan	Hycamtin®	Medicatie in te nemen	Niks in te nemen	Capsule(s)

2. Topotecan (Hycamtin®) via een infuus

Bij bepaalde indicaties kan uw arts Topotecan via een infuus voorstellen. De frequentie en de dosis hiervoor is afhankelijk van uw diagnose en zal met uw arts uitvoerig toegelicht worden.

4. Mogelijke bijwerkingen



Algemeen:

- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op de seksualiteit en intimiteit
- Beenmergonderdrukking met mogelijks verminderd aantal witte en/of rode bloedcellen en verminderd aantal bloedplaatjes.

5. Enkele praktische tips

- U mag Topotecan zowel met als zonder voedsel innemen. Slik de capsules in zonder te kauwen.
- U neemt de medicatie het best in op hetzelfde tijdstip van de dag.
- Bewaar de medicatie in de koelkast en op een veilige manier zodat niemand anders ze per ongeluk inneemt. (Bij accidentele inname verwittigt u best onmiddellijk uw huisarts of het antigifcentrum op het nr. 070 245.245)
- Wanneer u vergeten bent om de Topotecan in te nemen gaat u de volgende dag gewoon verder met de inname. U neemt geen dubbele dosis. Verwittig wel bij een volgend ziekenhuisbezoek als u een inname gemist hebt en breng het teveel aan medicatie die u daardoor kreeg mee naar het dagziekenhuis.

6. Topotecan en andere medicatie

Naast deze therapie kunnen er nog andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. De andere geneesmiddelen dienen om de behandeling comfortabeler te laten verlopen en om de bijwerkingen te beperken. De verpleegkundigen van het dagziekenhuis zullen u graag uitleg geven wat en wanneer u deze bijkomende medicatie dient in te nemen.

7. Wat als u last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak tijdig meldt. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Indien nodig zal de huisarts u doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Bij het optreden van volgende klachten komt u echter onmiddellijk naar de spoedopname :

- U hebt koorts: 1 maal hoger dan 38.5°C of 2 maal hoger dan 38°C;
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken;
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek.

8. Nuttige telefoonnummers:

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen :

- De onco-verpleegkundige
057 35 67 35
- Intern Oncologisch dagziekenhuis
057 35 62 61
- Verpleegafdeling Oncologie
057 35 64 41
- Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis
057 35 35 35