



Topotécan

94.070F

Centre hospitalier Jan Yperman
Briekestraat 12 • 8900 Ieper/Ypres
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

1. Qu'est-ce que le topotécan et comment agit-il ?

Le topotécan, également appelé Hycamtin®, est un médicament qui détruit les cellules. Il peut être administré en comprimés ou via une perfusion.

2. Quand traiter par topotécan ?

Le topotécan est administré pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules et du cancer de l'ovaire. Il est également utilisé en cas de cancer du col de l'utérus, en combinaison à un autre médicament, le Cisplatine®.

3. Déroulement du traitement

Votre médecin déterminera si vous recevrez le topotécan en comprimés ou via une perfusion.

1. Topotécan (Hycamtin®) en comprimés


Le schéma ci-dessous donne un aperçu du déroulement d'un cycle de traitement. Un cycle dure 3 semaines (21 jours). Le jour 1 est toujours le premier jour d'un nouveau cycle. Les 5 premiers jours de chaque cycle, vous prendrez du topotécan 1 fois par jour. Après le 5^e jour, vous ne prendrez plus de topotécan, et ce jusqu'au début du cycle suivant. Le cycle suivant débutera en principe 3 semaines après le jour 1, si les résultats des prises de sang et votre état général le permettent.

Nom générique	Nom commercial	Jour		Mode d'administration
		1-5	6-21	
Topotécan	Hycamtin®	Médicament à prendre	Rien à prendre	Gélule(s)

2. Topotécan (Hycamtin®) en perfusion

Dans certaines indications, votre médecin pourra vous proposer un traitement par topotécan en perfusion. La fréquence et la dose dépendent de votre diagnostic, et votre médecin vous expliquera ceci en détail.

4. Effets indésirables possibles



Généralités :

- Fatigue inhabituelle
- Influence sur la sexualité et l'intimité
- Suppression de la moelle osseuse avec possibilité de diminution du nombre de globules blancs et/ou rouges et du nombre de plaquettes.

5. Quelques conseils pratiques

- Vous pouvez prendre le topotécan avec ou sans nourriture. Avalez les gélules sans les mâcher.
- Prenez de préférence le médicament au même moment de la journée.
- Conservez le médicament au réfrigérateur, de manière sécurisée, afin que personne ne puisse le prendre accidentellement. (En cas d'ingestion accidentelle, avertissez immédiatement votre généraliste ou le Centre Antipoisons au 070/245 245).
- Si vous avez oublié de prendre le topotécan, continuez simplement le traitement normalement le lendemain. Ne prenez pas de dose double. Toutefois, lors de votre prochaine visite à l'hôpital, signalez que vous avez oublié une prise et apportez les médicaments excédentaires à l'hôpital de jour.

6. Autres médicaments et topotécan

En plus de ce traitement, il est possible qu'on vous prescrive encore d'autres médicaments, afin de rendre votre traitement plus confortable et de limiter les effets indésirables. L'équipe infirmière de l'hôpital de jour vous donnera volontiers des explications au sujet de ces médicaments, et vous dira quand et comment les prendre.

7. Que faire si vous souffrez d'effets indésirables ?

Il est important de signaler à temps toute anomalie ou tout inconfort. Adressez-vous en premier lieu à votre généraliste ou à l'infirmier/-ère à domicile. Si nécessaire, votre généraliste vous adressera à l'hôpital.

En présence des symptômes suivants, vous devez toutefois vous rendre immédiatement aux urgences :

- Vous avez de la fièvre : 1 fois plus de 38,5 °C ou 2 fois plus de 38 °C ;
- Vous souffrez de diarrhée/vomissements pendant plus de 2 jours ;
- Vous êtes essoufflé(e)/vous avez mal dans la poitrine.

8. Numéros de téléphone utiles :

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter les personnes suivantes :

- L'infirmier/-ère onco
057 35 67 35
- L'hôpital de jour oncologique
057 35 62 61
- Département infirmier d'Oncologie
057 35 64 41
- Numéro de téléphone général du Centre hospitalier Jan Yperman
057 35 35 35