








Alectinib (Alecensa[®]) 94.075N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

94.075N • 20190107
Diensthoofd patiëntenbegeleiding

1. Wat is Alectinib?

De werkzame stof in Alecensa® is Alectinib. Alectinib is een doelgerichte therapie, ook wel targeted therapie genoemd, dat zich bindt aan een bepaald eiwit in sommige kankercellen. Daardoor wordt de groei van de kankercellen afgeremd.

Het geneesmiddel Alectinib wordt toegediend in de vorm van capsules. Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen voorgeschreven worden om uw behandeling te ondersteunen.

2. Hoe verloopt uw behandeling met Alectinib?

Uw arts heeft u voorgesteld om een behandeling met Alectinib te starten.

U zal naar het dagziekenhuis of via de consultatie langs komen om de behandeling op te starten. Nadien neemt u de capsules Alectinib in zoals voorgeschreven.

Regelmatig komt u terug naar het dagziekenhuis of op consultatie voor verdere opvolging. Tijdens die opvolgafspraken bespreken we met u hoe de inname van de medicatie thuis verloopt en welke nevenwerkingen u ervaart. Ook gebeurt er die dag een bloedafname en kan het gebeuren dat er nog bijkomende onderzoeken gepland worden, bijv. CT-scan of RX-thorax.

Wanneer de bloedresultaten en de eventuele andere testen goed zijn en er anders geen bezwaren zijn voor de inname van Alectinib, dan wordt de medicatie terug door de arts voorgeschreven. De LOTUS- verpleegkundige zal de medicatie ophalen in de ziekenhuisapotheek en zal deze samen met uw volgende afspraak aan u bezorgen.

De duur van de therapie is afhankelijk van hoe u de therapie verdraagt en wat het effect is van de therapie. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn, waardoor (tijdelijk) de dosis verlaagd wordt of de therapie even onderbroken wordt. Op die manier krijgt u lichaam de tijd om te herstellen.


3. Hoe neemt u Alectinib in?

Alectinib bestaat in capsules van 150 mg. Er wordt duidelijk aan u meegedeeld welke dosis u in de komende periode moet innemen. Alectinib is enkel via het ziekenhuis verkrijgbaar. De startdosis is 600 mg/2x per dag. Dit zijn telkens 4 capsules.

U neemt de capsules 2 maal per dag in, telkens rond hetzelfde tijdstip. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid Alectinib in uw bloed stabiel blijft. Eveneens maakt regelmaat het voor u gemakkelijker om er tijdig aan te denken uw medicatie in te nemen.

Alectinib moet met een maaltijd ingenomen worden. Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water, zonder te kauwen. Alectinib moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Wanneer u overgebleven medicatie hebt, breng die dan terug mee naar het ziekenhuis. Spoel ze nooit weg via het toilet of de wasbak!

4. Mogelijke bijwerkingen



Indien er zich 1 of meerdere bijwerkingen voordoen, moet u contact opnemen met de huisarts en/of de thuisverpleegkundige. Bij vragen kan u contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met een gespecialiseerde dienst. Telefoonnummers vindt u achteraan de brochure. Tevens zijn er tips beschikbaar om de bijwerkingen aan te pakken. Vraag er gerust naar.

5. Wat met andere medicatie en voedingsmiddelen?

Dit is zeer belangrijk omdat door het gelijktijdig gebruik van meer dan één geneesmiddel de werking van die geneesmiddelen versterkt of verzwakt kan worden. Om die reden mag Alectinib niet samen met andere geneesmiddelen ingenomen worden zonder de toestemming van de behandelende arts.

Gebruik GEEN pompelmoes(sap), granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van St.-Janskruid. (St. Janskruid bestaat onder andere in druppels en tabletten van dr. A. Vogel). Die middelen kunnen de werking van Alectinib nadelig beïnvloeden.

6. Wat als...?

Wanneer u een dosis Alectinib bent vergeten, mag u de dosis tot 6 uur voor de volgende dosis inhalen. Wanneer er minder dan 6 uur is voor de volgende dosis, slaat u de vergeten dosis over. Bij braken vlak na de inname van Alectinib, hoeft u uw dosis niet te herhalen. Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip in. Als u een dosis te veel hebt ingenomen, contacteer dan uw behandelende arts. Bij accidentele inname door personen voor wie Alectinib niet werd voorgeschreven, moet onmiddellijk het antigifcentrum (tel. 070/245 245) gecontacteerd worden.

7. Belangrijke bijkomende adviezen bij een behandeling met Alectinib

U kunt een dagboek bijhouden om klachten en de inname van uw medicatie of eventuele problemen hierin te noteren. Het dagboek wordt bij een volgend ziekenhuisbezoek mee gebracht, zodat de behandelende arts een goed overzicht heeft van de nevenwerkingen die u thuis heeft ervaren. Dit helpt om de problemen die u ondervindt gericht te bespreken. Breng overgebleven medicatie terug mee naar het ziekenhuis, spoel die nooit weg via het toilet of de wasbak!

Tijdens de behandeling dient u een betrouwbaar voorbehoedsmiddel te gebruiken 4 weken voor de start van de behandeling tot 3 maanden na het stoppen van de behandeling.

8. Wanneer uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundigen raadplegen?

Als u last krijgt van een jeukende huid, gele verkleuring van de huid of het oogwit, misselijkheid en/of braken, pijn in de rechter bovenbuik, donkere urine, sneller blauwe plekken krijgen, neem dan onmiddellijk contact op met uw behandelende arts. Die klachten kunnen wijzen op leverproblemen.

Ook als u flauwvalt, duizelig bent of een lage bloeddruk heeft, verwittig dan uw behandelende arts. Dit kan wijzen op een vertraagde polsslag.

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak meldt aan een arts. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Bij het optreden van volgende klachten komt u onmiddellijk naar de spoedafdeling:

- U hebt koorts: 1 maal $>38,5^{\circ}\text{C}$ of 2 maal $> 38^{\circ}\text{C}$ met 1 uur tijdsverschil
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek

9. Nuttige telefoonnummers

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- **De onco-verpleegkundige**
057 35 67 35
- **Intern oncologisch dagziekenhuis**
057 35 62 61
- **Verpleegafdeling Oncologie**
057 35 64 41
- **Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis**
057 35 35 35