




Erlotinib (Tarceva®)

94.079N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net • 

94.079N • 20190116
Diensthoofd patiëntenbegeleiding

1. Wat is Erlotinib?

De werkzame stof in Tarceva® is Erlotinib. Erlotinib is een doelgerichte therapie, ook wel targeted therapie genoemd. Dit betekent dat er een fout is in de kankercellen die een eiwit aanmaken aangeduid als epidermale groeifactorreceptor (EGFR). Erlotinib wordt gebruikt bij een niet-kleincellig longkanker lokaal gevorderd of gemetastaseerd die EGFR positief zijn.

Het geneesmiddel Erlotinib wordt toegediend in de vorm van tabletten. Daarnaast kunnen er nog andere geneesmiddelen voorgeschreven worden om uw behandeling te ondersteunen.

2. Hoe verloopt uw behandeling met Erlotinib?

Uw arts heeft u voorgesteld om een behandeling met Erlotinib te starten.

U zal naar het dagziekenhuis of via de consultatie langs komen om de behandeling op te starten. Nadien neemt u de tabletten Erlotinib in zoals voorgeschreven.

Regelmatig komt u terug naar het dagziekenhuis of op consultatie voor verdere opvolging. Tijdens die opvolgafspraken bespreken we met u hoe de inname van de medicatie thuis verloopt en welke nevenwerkingen u ervaart. Ook gebeurt er die dag een bloedafname en kan het gebeuren dat er nog bijkomende onderzoeken gepland worden, bijv. CT-scan of RX-thorax.

Wanneer de bloedresultaten en de eventuele andere testen goed zijn en er anders geen bezwaren zijn voor de inname van Erlotinib, dan wordt de medicatie terug door de arts voorgeschreven. De LOTUS- verpleegkundige zal de medicatie ophalen in de ziekenhuisapotheek en zal deze samen met uw volgende afspraak aan u bezorgen.

De duur van de therapie is afhankelijk van hoe u de therapie verdraagt en wat het effect is van de therapie. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn, waardoor (tijdelijk) de dosis verlaagd wordt of de therapie even onderbroken wordt. Op die manier krijgt u lichaam de tijd om te herstellen.

3. Hoe neemt u Erlotinib in?

Erlotinib bestaat in tabletten van 100 mg en 150 mg. Er wordt duidelijk aan u meegedeeld welke dosis u in de komende periode moet innemen. Erlotinib is enkel via het ziekenhuis verkrijgbaar.


U neemt de tabletten nuchter in. Dat wil zeggen, minstens één uur voor de maaltijd of twee uur na de maaltijd.

U neemt de tabletten best op hetzelfde tijdstip van de dag in.

Bent u roker, laat u dan begeleiden om te stoppen met roken. Roken kan de werking van Erlotinib verminderen. Voor rookstopbegeleiding kunt u terecht bij de rookstop op het nummer 057/ 35 67 23.

Erlotinib moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Wanneer u overgebleven medicatie hebt, breng die dan terug mee naar het ziekenhuis. Spoel ze nooit weg via het toilet of de wasbak!

4. Mogelijke bijwerkingen



Indien er zich 1 of meerdere bijwerkingen voordoen, moet u contact opnemen met de huisarts en/of de thuisverpleegkundige. Bij vragen kan u contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met een gespecialiseerde dienst. Telefoonnummers vindt u achteraan de brochure. Tevens zijn er tips beschikbaar om de bijwerkingen aan te pakken. Vraag er gerust naar.

5. Wat met andere medicatie en voedingsmiddelen?

Dit is zeer belangrijk omdat door het gelijktijdig gebruik van meer dan één geneesmiddel de werking van die geneesmiddelen versterkt of verzwakt kan worden. Om die reden mag Erlotinib niet samen met andere geneesmiddelen ingenomen worden zonder de toestemming van de behandelende arts.

Gebruik GEEN pompelmoes(sap), granaatappel, sterfruit of preparaten op basis van St.-Janskruid. (St. Janskruid bestaat onder andere in druppels en tabletten van dr. A. Vogel). Die middelen kunnen de werking van Erlotinib nadelig beïnvloeden.

Indien u de tabletten niet kunt inslikken, kunnen ze geplet worden. U kunt ze dan verder innemen met een glas mineraalwater of cola. U gaat als volgt te werk: plet de tabletten en doe ze in een voldoende hoeveelheid vloeistof. Was nadien uw handen. Roer met de lepel tot alles volledig opgelost is. Drink onmiddellijk de hele inhoud van het glas leeg. Was het glas af of zie erop toe dat het glas niet door iemand anders wordt gebruikt.

6. Wat als...?

Wanneer u een dosis Erlotinib bent vergeten, sla dan de vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om de gemiste dosis in te halen. Neem de volgende dosis gewoon in op het geplande tijdstip. Meld een vergeten dosis bij uw volgende ziekenhuisbezoek.

Bij braken vlak na de inname van Erlotinib, hoeft u uw dosis niet te herhalen. Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip in.

Als u een dosis te veel hebt ingenomen, contacteer dan uw behandelende arts. Bij accidentele inname door personen voor wie Erlotinib niet werd voorgeschreven, moet onmiddellijk het antigifcentrum (tel. 070/245 245) gecontacteerd worden.

7. Belangrijke bijkomende adviezen bij een behandeling met Erlotinib

U kunt een dagboek bijhouden om klachten en de inname van uw medicatie of eventuele problemen hierin te noteren. Het dagboek wordt bij een volgend ziekenhuisbezoek mee gebracht, zodat de behandelende arts een goed overzicht heeft van de nevenwerkingen die u thuis heeft ervaren. Dit helpt om de problemen die u ondervindt gericht te bespreken. Breng overgebleven medicatie terug mee naar het ziekenhuis, spoel die nooit weg via het toilet of de wasbak!

8. Wanneer uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundigen raadplegen?

Als u last krijgt van een jeukende huid, gele verkleuring van de huid of het oogwit, misselijkheid en/of braken, pijn in de rechter bovenbuik, donkere urine, sneller blauwe plekken krijgen, neem dan onmiddellijk contact op met uw behandelende arts. Die klachten kunnen wijzen op leverproblemen.

Ook als u flauwvalt, duizelig bent of een lage bloeddruk heeft, verwittig dan uw behandelende arts. Dit kan wijzen op een vertraagde polsslag.

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak meldt aan een arts. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Bij het optreden van volgende klachten komt u onmiddellijk naar de spoedafdeling:

- U hebt koorts: 1 maal $>38,5^{\circ}\text{C}$ of 2 maal $> 38^{\circ}\text{C}$ met 1 uur tijdsverschil
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek

9. Nuttige telefoonnummers

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- **De onco-verpleegkundige**
057 35 67 35
- **Intern oncologisch dagziekenhuis**
057 35 62 61
- **Verpleegafdeling Oncologie**
057 35 64 41
- **Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis**
057 35 35 35