








Pemetrexed/Alimta

94.089N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net •     

94.089N • 20190614
Diensthoofd patiëntenbegeleiding

1. Wat is Pemetrexed/Alimta en hoe werkt het?

Pemetrexed/Alimta is een chemotherapie die bestaat uit 1 geneesmiddel: Pemetrexed. Het wordt gebruikt bij een behandeling van niet-kleincellige longtumoren. Chemotherapie is een medicijn die kankercellen doodt of hun celdeling afremt. Hierdoor kan de kanker genezen of kan een tumor kleiner worden.

2. Hoe wordt Pemetrexed/Alimta toegediend?

Pemetrexed/Alimta wordt toegediend via een infuus en verloopt volgens een cyclus van 21 dagen. Dit betekent dat, als u telt vanaf de eerste dag van de cyclus, u zich na 21 dagen opnieuw op dag 1 van de cyclus bevindt. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedresultaten en uw algemene toestand dit toelaten.

Generieke naam	Merksnaam	Dag					Wijze van toediening
		-1	1	2	3-20	21=dag -1	
Pemetrexed	Alimta®		x				Infuus 10'
Methylprednisolon	Medrol® 24mg	8u 18u	18u	8u 18u		8u 18u	24mg=3/4co 32mg=1co

3. Verloop van de behandeling:

Voor het starten van de therapie is het noodzakelijk om zeker één week voordien 1 inspuiting vitamine B12® te krijgen. Dit wordt om de 9 weken herhaald in het ziekenhuis. Eveneens wordt er 5 dagen voor start therapie Folavit® 0.4mg opgestart. Dit tot 3 weken na de laatste toediening. Deze medicatie is nodig om de toxiciteit van de therapie te verminderen.

Thuis dient u ook steeds Cortisone (Medrol®) in te nemen om de nevenwerkingen te verminderen. Dit doet u als volgt :

- De dag voor de chemotherapie (dag -1) : 3/4de van een comprimé van 32 mg. Medrol®. Dit is dus gelijk aan 24 mg. In te nemen om 8 uur en 18 uur.
- De dag van de chemotherapie (dag 1) : 3/4de van een comprimé van 32 mg (= 24 mg.) Om 18u.
- De dag na de chemotherapie (dag 2) : 3/4de van een comprimé van 32 mg. (=24mg.) Telkens om 8 u en 18u.

De behandeling start steeds met een spoelinfuus om uw nieren beter te beschermen.

4. Belang van ondersteunende medicatie:


Het is heel belangrijk dat de ondersteunende medicatie Medrol®, vitamine B12® en Folavit® ingenomen wordt. De chemotherapie mag enkel toegediend worden als deze medicatie correct ingenomen wordt.

5. Aandachtspunten bij Pemetrexed (Alimta®)

Tijdens de behandeling mogen er geen NSAID's (bijvoorbeeld Voltaren®, Ibuprofen®, Feldene®) en Aspirine® gebruikt worden gedurende 2 dagen voor, op de dag van en 2 dagen na toediening van de Pemetrexed. Deze medicatie remt de uitscheiding van de afvalstoffen van de chemotherapie via de nieren, waardoor deze voor meer en ernstigere bijwerkingen zorgen.

De inname van corticosteroiden (namelijk Medrol®) kan bijwerkingen veroorzaken zoals: maaglast, slaapmoeilijkheden, stemmingswisselingen en verhoogde eetlust. Toch is het uiterst belangrijk dat deze medicatie ingenomen wordt in functie van uw behandeling.

6. Mogelijke bijwerkingen



Indien er zich 1 of meerdere bijwerkingen voordoen, moet u contact opnemen met de huisarts en/of de thuisverpleegkundige. Bij vragen kan u contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met een gespecialiseerde dienst. Telefoonnummers vindt u achteraan de brochure. Tevens zijn er tips beschikbaar om de bijwerkingen aan te pakken. Vraag er gerust naar.

7. Wat als u last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak meldt aan een arts. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Bij het optreden van volgende klachten komt u onmiddellijk naar de spoedafdeling:

- U hebt koorts: 1 maal $>38,3^{\circ}\text{C}$ of 2 maal $> 38^{\circ}\text{C}$ met 1 uur tijdsverschil
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek

8. Nuttige telefoonnummers

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- | | |
|---|---|
| • De onco-verpleegkundige
057 35 67 35 | • Intern oncologisch dagziekenhuis
057 35 62 61 |
| • Verpleegafdeling Oncologie
057 35 64 41 | • Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis
057 35 35 35 |