




Carboplatine- Gemcitabine

94.091N

Jan Yperman Ziekenhuis • Briekestraat 12 • 8900 Ieper
www.yperman.net • 057 35 35 35
info@yperman.net • 

94.091 • 20190617
Diensthoofd Patiëntenbegeleiding

1. Wat is Carboplatine/Gemcitabine en hoe werkt het?

De therapie bestaat uit twee verschillende geneesmiddelen (cytostatica): Carboplatine(Paraplatin®) en Gemcitabine (Gemzar®). Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

2. Wanneer Carboplatine/Gemcitabine?

Carboplatine/Gemcitabine wordt gebruikt bij de behandeling van een plaatselijk uitgebreide of uitgezaaide niet-kleincellig longcarcinoom.

3. Hoe wordt Carboplatine/Gemcitabine toegediend?

Carboplatine/Gemcitabine wordt toegediend via een infuus en verloopt volgens een cyclus van 21 dagen. Dit betekent dat, als u telt vanaf de eerste dag van de cyclus, u zich na 21 dagen opnieuw op dag 1 van de cyclus bevindt. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1.

4. Verloop van de behandeling:

Voor het toedienen van Carboplatine/Gemcitabine wordt er op dag 1 en op dag 8 een dagopname voorzien. Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op Carboplatine. In dit geval kan een overnachting dan noodzakelijk zijn.

Schematisch ziet dit er dus als volgt uit :

Generieke naam	Merknaam	Dag				Wijze van toediening
		1	2-7	8	9-21	
Gemcitabine	Gemzar®	x	thuis	x	thuis	Infuus over 1 uur
Carboplatine	Paraplatin®	x	thuis		thuis	Infuus over 1 uur


(X = de dag waarop u de therapie krijgt op het dagziekenhuis)

U krijgt ook vocht toegediend. Dit is heel belangrijk voor de nierfunctie. Tijdens uw dagopname zal uw gewicht goed opgevolgd worden. Als u te weinig plast en u te veel in gewicht toeneemt, kan het zijn dat u extra medicatie toegediend krijgt om zo meer te kunnen plassen.

Bij elke dagopname gebeurt een bloedafname. De toediening van Carboplatine/Gemcitabine zal enkel doorgaan als de bloedresultaten en uw algemene toestand dit toelaten.

Het totaal aantal keer dat u Carboplatine/Gemcitabine krijgt is afhankelijk van het effect dat de therapie bij u en op de tumor heeft. Ook de manier waarop uw lichaam reageert kan een invloed hebben op de duur van de therapie.

5. Mogelijke bijwerkingen



Andere:

- Verminderd aantal witte en/of rode bloedcellen
- Verminderd aantal plaatjes
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet

Indien er zich 1 of meerdere bijwerkingen voordoen, moet u contact opnemen met de huisarts en/of de thuisverpleegkundige. Bij vragen kan u contact opnemen met het intern dagziekenhuis of met een gespecialiseerde dienst. Telefoonnummers vindt u achteraan de brochure. Tevens zijn er tips beschikbaar om de bijwerkingen aan te pakken. Vraag er gerust naar.

6. Carboplatine/Gemcitabine en andere medicatie:

Gebruik tijdens de behandeling met Carboplatine/Gemcitabine geen geneesmiddelen of voedingssupplementen zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Deze medicatie kan het effect van de therapie beïnvloeden.

7. Wat als u last krijgt van bijwerkingen?

Het is belangrijk dat u elke abnormaliteit of ongemak meldt aan een arts. Richt u in eerste instantie tot uw huisarts of thuisverpleegkundige. Bij het optreden van volgende klachten komt u onmiddellijk naar de spoedafdeling:

- U hebt koorts: 1 maal $>38,3^{\circ}\text{C}$ of 2 maal $> 38^{\circ}\text{C}$ met 1 uur tijdsverschil
- U hebt langer dan 2 dagen diarree/braken
- U hebt last van kortademigheid/pijn op de borststreek

8. Nuttige telefoonnummers

Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met volgende personen:

- **De onco-verpleegkundige**
057 35 67 35
- **Intern oncologisch dagziekenhuis**
057 35 62 61
- **Verpleegafdeling Oncologie**
057 35 64 41
- **Algemeen telefoonnummer Jan Yperman Ziekenhuis**
057 35 35 35