

00144-NL

nl


Bronchoscopie

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

Jouw zorg
is onze zorg



Wat is een bronchoscopie?



Een bronchoscopie is een medisch onderzoek waarbij een arts met een dunne, soepele buis (**bronchoscoop**) in de luchtwegen en longen kijkt.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Een bronchoscopie wordt uitgevoerd bij:

- de diagnose van een longinfectie of -tumor, bij een onverklaarde hoest of bij het ophoesten van bloed;
- het nemen van weefselstalen;
- het opsporen en verwijderen van vreemde voorwerpen;
- het lokaliseren en stoppen van een longbloeding.

Het onderzoek kan zowel ambulant gebeuren (in het dagziekenhuis), als tijdens een opname.

Hoe bereid je je goed voor?

Om de bronchoscopie vlot te laten verlopen, is een goede voorbereiding belangrijk.

Nuchter zijn

Vanaf 4 uur voor de operatie mag je niet eten, drinken, of roken.

Medische voorgeschiedenis

Breng voor het onderzoek de arts op de hoogte over:

- bloedingsproblemen: soms is een bloedonderzoek vooraf nodig om de bloedstolling te controleren
- hartafwijkingen of een kunstklep
- diabetes
- (vermoeden van) zwangerschap

Medicatie

Bespreek altijd met de arts welke medicijnen je gebruikt.

- Aspirine hoeft je voor dit onderzoek niet te stoppen.
- Andere bloedverdunners moeten, afhankelijk van het soort medicijn, 2 tot 7 dagen vóór het onderzoek gestopt worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de arts.

Bloedtesten

Soms is bloedonderzoek nodig om bloedstolling te controleren.

Vervoer naar huis

Na een bronchoscopie mag je niet zelf naar huis rijden. Regel vooraf iemand die jou kan begeleiden en naar huis kan brengen.

Hoe verloopt het onderzoek?

1. Je neemt plaats in een aangepaste stoel, met je hoofd in een kussen.
2. **Verdoving:** indien gewenst kan er een rustgevend geneesmiddel worden toegediend via de bloedbaan.
3. Tijdens het onderzoek krijg je extra zuurstof toegediend. Je hartslag en zuurstofsaturatie worden voortdurend gemeten.
4. De keel wordt verdoofd met een keelspray.
5. We plaatsen een bijtring tussen de tanden.
6. **Scope plaatsen:** de arts schuift de bronchoscoop (dun slangetje) via de mond of de neus langzaam naar de luchtpijp (trachea) en de diverse luchtpijptakken (bronchi). Je kan tijdens het onderzoek niet spreken, maar wel normaal ademen.
7. Na het onderzoek blijf je minstens nog een uur in het ziekenhuis ter observatie. Twee uur na het onderzoek mag je terug eten en drinken.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer **15-30 minuten**.

Mogelijke bijwerkingen of complicaties

Een bronchoscopie is een **veilig** onderzoek met **zeldzame verwikkelingen**. Na het onderzoek kun je je verwachten aan:

- **Keelpijn of heesheid:** lichte pijn of droog gevoel in de keel
- **Hoesten:** soms een prikkelhoest


Zelden voorkomende bijwerkingen


Contacteer in deze gevallen meteen een arts of ga naar de dienst Spoed.

- Allergische reactie op verdovingsmiddel
- Schade aan de stembanden
- Longbloeding
- Klaplong
- Infectie
- Hartritmestoornissen
- Laag zuurstofgehalte

! Contacteer een arts of kom binnen via de dienst spoedgevallen.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Contact

Secretariaat Cardiologie – Pneumologie

Openingsuren:

Maandag - donderdag: 8 - 17.30 uur

Vrijdag: 8 - 12.30 uur & 13 - 17.30 uur

057 35 71 90

seccardiopneumo@yperman.net

Volg route 31

Meer info op: pneumo.yperman.net

Liever digitaal?
Scan de QR-code



Deze informatiebrochure is met de grootste zorg opgemaakt. Ze bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Jan Yperman Ziekenhuis vzw, onze artsen en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in deze brochure.

Opmerkingen en/of suggesties kan je melden via communicatie@yperman.net

Jan Yperman Ziekenhuis vzw
Briekestraat 12, 8900 Ieper
info@yperman.net
057 35 35 35
www.yperman.net

