

00383-NL

nl

Warmte- behandeling PRF

Gepulseerde radiofrequente behandeling

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

Jouw zorg
is onze zorg



Wat is een PRF-behandeling?

Een PRF-behandeling (gepulseerde radiofrequente stroom) gebeurt ter hoogte van een zenuw, op de plaats waar die uit de wervelkolom komt. Deze behandeling wordt gebruikt bij **uitstralingspijn in je armen, borstkas of benen**, en kan plaatsvinden in de nek (cervicaal), borstkas (thoracaal) of lage rug (lumbaal).

De ingreep wordt enkel uitgevoerd als een **proefblokkade** eerder een positief resultaat gaf.

Tijdens de behandeling lig je op je rug of buik, afhankelijk van welke zenuw behandeld wordt. Na het ontsmetten van de huid bepaalt de arts met **röntgenstralen** de juiste prikplaats. De huid wordt plaatselijk verdoofd en een **dunne naald** wordt ingebracht.

Met een zwakke elektrische stroom controleert de arts of de naald goed zit. Vervolgens wordt de **zenuw gedurende ongeveer 8 minuten verwarmd tot maximaal 42°C**. Door deze lage temperatuur ontstaat geen schade aan de zenuw. Soms wordt er nog plaatselijke verdoving rond de zenuw gespoten.

De pijnvermindering wordt na **6 tot 8 weken** beoordeeld.



Mogelijke bijwerkingen of complicaties

De behandeling gebeurt altijd onder strikt steriele omstandigheden. Toch kunnen er, zoals bij elke ingreep, bijwerkingen of complicaties optreden.

Vaak voorkomende bijwerkingen

- **Pijn of gevoeligheid op de prikplaats:** dit kan enkele dagen aanhouden. Soms ontstaat er een blauwe plek als er een bloedvat geraakt is.
- **Krachtsvermindering of tintelingen:** je kunt tijdelijk minder kracht hebben, tintelingen of een dof gevoel ervaren. Dit komt door de plaatselijke verdoving en gaat vanzelf over.
- **Tijdelijke toename van pijn:** de pijn in het been kan na de behandeling (enkele dagen) wat toenemen, maar verdwijnt vanzelf.

Soms voorkomende bijwerkingen

- **Hoofdpijn, lichtschuwheid en/of misselijkheid** kunnen voorkomen na een behandeling van de nek. Deze symptomen ontstaan bij het rechtekomen en verdwijnen spontaan bij het neerliggen.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

- **Infecties, zenuw schade of verlamingsverschijnselen** zijn uiterst zeldzaam.
- Krijg je **hevige hoofdpijn** met **lichtschuwheid, koorts of stijve nek**, neem dan **onmiddellijk contact** op met je arts, huisarts of de spoeddienst. Dit kan wijzen op een ernstige infectie (meningitis).

Verwittig ons zo snel mogelijk bij ziekte of koorts

- Verpleegkundigen pijnkliniek: 057 35 63 26 (dag van de ingreep)
- Secretariaat pijnkliniek: 057 35 61 20 (van maandag tot vrijdag: 8.30 - 17 uur)
- Spoeddienst: 057 35 60 00

Contact

Secretariaat Pijnkliniek

Openingsuren:
Maandag - vrijdag: 8.30 - 17 uur

057 35 61 20
pijnkliniek@yperman.net

Volg route 79

Meer info op: pijnkliniek.yperman.net

Liever digitaal?
Scan de QR-code



Deze informatiebrochure is met de grootste zorg opgemaakt. Ze bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Jan Yperman Ziekenhuis vzw, onze artsen en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in deze brochure.

Opmerkingen en/of suggesties kan je melden via communicatie@yperman.net

Jan Yperman Ziekenhuis vzw
Briekestraat 12, 8900 Ieper
info@yperman.net
057 35 35 35
www.yperman.net

