

00386-NL

nl

SIG-infiltratie

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

Jouw zorg
is onze zorg




Wat is een SIG-infiltratie?

Het sacro-iliacaal gewricht is de verbinding tussen het heiligbeen (sacrum) en het darmbeen (ilium).

Door **slijtage, een hernia, ontsteking, operatie of ongeval** kan er druk of irritatie op het SI-gewricht ontstaan. De pijn die daardoor ontstaat in de onderrug of zitvlak manifesteert zich aan één zijde van je lichaam.

Het doel van de infiltratie is om de **ontsteking te verminderen**, zodat de pijn afneemt en je weer **makkelijker kunt bewegen**. De pijnvermindering treedt doorgaans op binnen **48 uur tot 10 dagen na de infiltratie**.



Hoe verloopt de behandeling?

Je ligt tijdens de behandeling op je **buik**, ondersteund door een speciaal kussen. Zodra je comfortabel ligt, bepaalt de arts met **röntgenstralen (scopie)** de juiste plaats voor de epidurale injectie.

De huid wordt **ontsmet en steriel afgedekt**, daarna krijg je **plaatselijke verdoving**. Vervolgens brengt de arts een **dunne naald** in tot in het **SI-gewricht**. Met **contrastvloeistof** controleren we of de naald goed zit. Daarna worden de **corticosteroiden** toegediend. De uitstralende pijn kan op dat moment wat toenemen.

Bij aanzienlijke pijnvermindering na deze behandeling kan een **radiofrequente behandeling** van het SI-gewricht worden overwogen.

Mogelijke bijwerkingen of complicaties

De behandeling gebeurt altijd onder strikt steriele omstandigheden. Toch kunnen er, zoals bij elke ingreep, bijwerkingen of complicaties optreden.

Vaak voorkomende bijwerkingen

- **Pijn of gevoeligheid op de prikplaats:** dit kan enkele dagen aanhouden. Soms ontstaat er een blauwe plek als er een bloedvat geraakt is.
- **Bij corticosteroïden:** je kunt last krijgen van blozen, zweten, milde hoofdpijn, maagklachten of een tijdelijk verhoogde bloedsuiker. Heb je diabetes, controleer dan 2 tot 6 dagen extra je bloedsuiker.

Soms voorkomende bijwerkingen

- **Krachtenvermindering of tintelingen:** je kunt tijdelijk minder kracht hebben, tintelingen of een dof gevoel ervaren. Dit komt door de plaatselijke verdoving en gaat vanzelf over.
- **Allergische reactie:** de prikplaats kan wat rood, gezwollen of gevoelig zijn. Dit trekt meestal binnen enkele dagen weg. Worden de klachten erger, neem dan contact op met je huisarts.

Zelden voorkomende bijwerkingen

- **Toename van pijn:** is mogelijk tot enkele dagen na de behandeling maar verdwijnt weer vanzelf.
- **Hormonale veranderingen bij vrouwen:** je menstruatie kan tijdelijk verstoord raken en de anticonceptiepil is tijdens die cyclus niet betrouwbaar. Tijdens de menopauze kunnen opvliegers toenemen.

Uiterst zelden voorkomende bijwerkingen

- **Zenuw- of ruggenmergbeschadiging, infecties, blindheid, hersen- of ruggenmerginfarct, incontinentie, blaasfunctiestoornissen of verlamingsverschijnselen** zijn uiterst zeldzaam.

Verwittig ons zo snel mogelijk bij ziekte of koorts

- Verpleegkundigen pijnkliniek: 057 35 63 26 (dag van de ingreep)
- Secretariaat pijnkliniek: 057 35 61 20 (van maandag tot vrijdag: 8.30 - 17 uur)
- Spoeddienst: 057 35 60 00

Contact

Secretariaat Pijnkliniek

Openingsuren:

Maandag - vrijdag: 8.30 - 17 uur

057 35 61 20

pijnkliniek@yperman.net

Volg route 79

Meer info op: pijnkliniek.yperman.net

Liever digitaal?
Scan de QR-code



Deze informatiebrochure is met de grootste zorg opgemaakt. Ze bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Jan Yperman Ziekenhuis vzw, onze artsen en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in deze brochure.

Opmerkingen en/of suggesties kan je melden via communicatie@yperman.net

Jan Yperman Ziekenhuis vzw
Briekestraat 12, 8900 Ieper
info@yperman.net
057 35 35 35
www.yperman.net

