

Inentingen voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Kind en Gezin zorgt gratis voor een aantal inentingen. Welke inentingen uw kind kan krijgen bij Kind en Gezin kunt u terugvinden op www.kindengezin.be of in het kinderboekje.

Niet terugbetaalde inentingen:

1.Pneumokokken: Pneumokokken kunnen ernstige oor- en longontstekingen veroorzaken, maar ook hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging met ernstige blijvende letsels of overlijden tot gevolg.
=> *De Hoge Gezondheidsraad* beveelt aan om zuigelingen te vaccineren met het PCV20 vaccin, dat bescherming biedt tegen 20 types pneumokokken.

Het huidige gratis toegediende vaccin op Kind en Gezin bevat 13 types (PCV 13).

De aanbeveling volgt op de toename aan ernstige infecties met pneumokokken van de types die niet in het PCV13 vaccin zitten maar wel in het PCV20 vaccin.

- Inentingsschema:
 - 4 dosissen: 2m-4m-6m-12m
- Huidige vaccin in België, kostprijs/dosis: Prevenar 20 67.51euro
- Toediening kan op kind en gezin, voorschrift via huisarts of kinderarts

2.MeningokokB : Meningokokken kunnen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken met ernstige blijvende letsels of overlijden tot gevolg. De ziekte is zeldzaam.

=> *De Hoge Gezondheidsraad* beveelt dit niet veralgemeend aan, het kan individueel een goede bescherming bieden, vooral voor volgende leeftijdscategorieën: 0 tot 5-jarigen, 15 tot 19-jarigen en personen met verhoogd risico (te bespreken met eigen arts).

- Inentingsschema:
 - 2 tot 23 maanden: 3 dosissen (vb 2.5m-4.5m-13m)
 - Vanaf 2 jaar: 2 dosissen (min.2m tussen)
- Huidige vaccins in België, kostprijs/dosis: Bexsero 86,52 euro (leeftijd > 2 maanden), Trumenba 76.98euro (leeftijd > 10jaar).
- Toediening bij huisarts of kinderarts

3.Varicella (waterpokken, windpokken): Dit is een veel voorkomende ziekte. In een klein aantal gevallen zijn er ernstige verwickelingen (longontsteking, sepsis, hersenschade).

=> *De Hoge Gezondheidsraad* beveelt dit niet veralgemeend aan tenzij voor adolescenten of volwassenen die nog geen varicella doormaakten en personen met verhoogd risico (te bespreken met eigen arts), het is wel voordelig voor het kind.

- Inentingsschema:
 - Vanaf 1 jaar: 2 dosissen met tussentijd van 8 weken of meer
- Huidige vaccins in België, kostprijs/dosis: Varilrix 48,68 euro; Varivax 52,52 euro
- Toediening bij huisarts of kinderarts

4.Griep: In sommige gevallen leidt griep tot ernstige ziekte en meer risico op ernstige verwickelingen.

=> *De Hoge Gezondheidsraad* beveelt aan om kinderen met een verhoogd risico op ernstig verloop te vaccineren in samenspraak met uw arts.

- Inentingsschema:
 - Tussen midden oktober en midden december 1 dosis, bij kinderen jonger dan 9 jaar die voor het eerst een griepvaccin krijgen dient een tweede dosis gegeven te worden na 4 weken
- Toediening bij huisarts of kinderarts

5.Reisinentingen: informatie te verkrijgen via de reiskliniek op www.yperman.net (diensten, reiskliniek).

Meer info: bij Kind en Gezin, uw huisarts, kinderarts en op www.hogegezondheidsraad.be.



Vaccinations pour les enfants de 0 à 18 ans

L'ONE fournit gratuitement un certain nombre de vaccins. Vous trouverez les vaccins que votre enfant peut recevoir chez l'ONE sur www.one.be ou dans le carnet de santé.

Vaccins non remboursés:

1.Pneumocoques : les pneumocoques peuvent provoquer des otites et des pneumonies graves, mais aussi des méningites ou des septicémies pouvant entraîner des séquelles graves ou la mort

=>Le Conseil supérieur de la santé recommande de vacciner les nourrissons avec le vaccin PCV20, qui protège contre 20 types de pneumocoques. Le vaccin actuellement administré gratuitement à l' ONE contient 13 types (PCV 13). Cette recommandation fait suite à l'augmentation des infections graves par des pneumocoques de types non couverts par le vaccin PCV13, mais bien par le vaccin PCV20.

- Schéma de vaccination :
 - 4 doses : 2m-4m-6m-12m
- Vaccin existant actuellement en Belgique, coût/dose : Prevenar 20 67,51 euros
- L'administration peut se faire à l'ONE

2.Méningocoque B : Les méningocoques peuvent provoquer une méningite ou une septicémie, pouvant entraîner de graves lésions permanentes ou le décès. La maladie est rare.

=>Le Conseil supérieur de la santé ne le recommande pas de manière systématique. Il peut offrir une bonne protection individuelle, surtout pour les catégories d'âge suivantes : les 0 à 5 ans, les 15 à 19 ans, les personnes courant un risque accru (à voir avec votre médecin)

- Schéma de vaccination :
 - 2 à 23 mois : 3 doses (schéma de l'ONE: 3m-5m-18m)
 - À partir de 2 ans : 2 doses (min.2m d' interval)
- Vaccins existant actuellement en Belgique, coût/dose : Bexsero 86,52 euros (âge >2 mois), Trumenba 76,98 euros (âge > 10 ans).
- L'administration peut se faire à l'ONE

3.Varicelle : La varicelle est une maladie très fréquente. Dans un petit nombre de cas, on note des complications graves (pneumonie, septicémie, lésions cérébrales).

=>Le Conseil supérieur de la santé ne le recommande pas de manière systématique sauf pour les adolescents ou les adultes n'ayant pas encore eu la varicelle et pour les personnes à risque accru (à voir avec votre médecin). Le vaccin est quand même bénéfique pour l'enfant.

- Schéma de vaccination :
 - À partir de 1 an : 2 doses avec un minimum de 8semaines d'intervall
- Vaccins existant actuellement en Belgique, coût/dose : Varilrix 48,68 € ; Varivax 52,52 €
- L'administration peut se faire à l'ONE

4..Grippe : dans certains cas, la grippe entraîne une maladie grave et augmente le risque de complications graves.

=> Le Conseil supérieur de la santé recommande de vacciner les enfants présentant un risque accru de complications graves, en concertation avec votre médecin.

- Schéma de vaccination :
 - Entre mi-octobre et mi-décembre, 1 dose. Chez les enfants de moins de 9 ans qui reçoivent un vaccin contre la grippe pour la première fois, une deuxième dose doit être administrée après 4 semaines.
- Administration par le médecin généraliste ou le pédiatre.

5.Vaccinations de voyage : informations disponibles via la clinique du voyage sur www.yperman.net (services, clinique du voyage).

Plus d'informations : auprès de l'ONE, de votre médecin généraliste, de votre pédiatre ou sur le site du Conseil supérieur de la santé <https://www.hgr-css.be/fr>

