

VKA (vitamine K antagonisten) (Sintrom®, Marevan®, Marcoumar®)

STOP VKA preoperatief
Sintrom® **3 d** preop
Marevan® **5 d** preop
Marcoumar® **14 d** preop

Bridging met LMWH enkel bij zeer hoog
trombo-embolisch risico*
START LMWH zodra INR < 2

Sintrom® 2d na stoppen
Marevan® 3d na stoppen
Marcoumar® 5d na stoppen

* Mechanische kunstkleppen: **therapeutische dosis**
Alle (dubbel)> mitraalklep > aortaklep)

Preventie van Stroke/SE bij VKF: **profylactische dosis**

Recent CVA/TIA < 3 maand
CHA2DS2-VASc score > 4
Vroeger CVA na stop antico

DVT-Longembool: **profylactische dosis**

Recent < 3 maand
Onderliggende trombofilie (maligniteit, recidief,
antifosfolipidensyndroom, meerdere genetische
afwijkingen,...)

Profylactisch LMWH Fraxiparine®
1x0,1ml/10kg/dag Clexane® 1x1mg/kg/dag
Bij creat clear > 60 ml/min

Therapeutisch LMWH Fraxiparine® 2x0,1ml/10kg/dag
Clexane® 2x1mg/kg/dag
Bij creat clear > 60 ml/min

Controle INR dag voor de ingreep
Laatste dosis LMWH : 24hr vóór de ingreep of D-1 omstreeks 8u
Gebruik geen lang werkende LMWH