Vaccinatiegids 2026-2027
ONCOLOGISCHE PATIËNTEN

Tijdens een actieve oncologische behandeling mogen geen levende vaccins worden toegediend.

Vragen?

Contacteer jouw oncoloog via het secretariaat interne 057 35 72 70 of vraag het aan de onco-coach

Welke vaccins zijn aangeraden?

Influenzavaccin (griepvaccin)

- Jaarlijkse vaccinatie in oktober of november.
- Mantelzorgers, partners en personen die onder hetzelfde dak wonen, worden het best ook jaarlijks gevaccineerd.
- Vaccinatie kan ook bij de apotheker.
- **Basisvaccin**: trivalent vaccin (Influvac®, Vaxigrip®, Alfarix®). Alle patiënten komen via de derdebetalersregeling in aanmerking, op voorschrift.
- **Voorkeursvaccin**: Fluad® (met adjuvans) of Efluelda® (hooggedoseerd). Vanaf 65 jaar komt de patiënt via de derdebetalersregeling in aanmerking, op voorschrift. Let op: de terugbetaling is gebaseerd op de leeftijd.

COVID-19-vaccin

- Jaarlijkse vaccinatie in oktober of november.
- Mantelzorgers, partners en personen die onder hetzelfde dak wonen, worden het best ook jaarlijks gevaccineerd.
- Vaccinatie kan ook bij de apotheker.

Pneumokokkenvaccin

- Vaccinatie kan het hele jaar door.
- Bespreek met je arts welk type vaccin aangewezen is en of herhaling nodig is.
- Het vaccin is verkrijgbaar bij je huisarts.

Herpes-zostervaccin: Shingrix® (vaccin tegen de zona)

- Het vaccin kan het hele jaar door worden toegediend.
- Je krijgt twee dosissen. De tweede dosis wordt na vier tot acht weken toegediend.
- De eerste dosis wordt idealiter twee weken vóór de start van de oncologische behandeling toegediend.
- Vraag je huisarts om een attest voor de adviserend arts in orde te brengen.

Arexvy®: RSV-vaccin

- De ideale vaccinatieperiode is september en oktober. Het RSV-seizoen begint meestal in oktober, net vóór het COVID-19- en griepseizoen.
- Terugbetaling is enkel mogelijk voor 65-plussers.
- Vraag je huisarts om een attest voor de adviserend arts in orde te brengen.

Difterie, tetanus en pertussis: Boostrix®

- Te herhalen om de tien jaar.

Wanneer laat je je best vaccineren?

Idealiter laat je je twee tot vier weken vóór de start van de therapie vaccineren. Is dat niet mogelijk? Volg dan onderstaande aanbevelingen.

- **Krijg je chemotherapie?**
  1-3 dagen voor de start van een volgende cyclus chemotherapie (bvb in een rustweek).

- **Krijg je immunotherapie?**
  Gelijk wanneer behalve op de dag van de toediening van de immunotherapie.
  LET OP: geen vaccins bij ernstige nevenwerkingen of bij inname van hoge dosissen corticoïden

- **Krijg je doelgerichte therapie?**
  Overleg eerst met jouw oncoloog.